



# Enquête Nationale de Mortalité Hivernale des colonies d'Abeilles ENMHA 2023-2024

Résultats de la région  
Normandie  
Rapport



LA PLATEFORME  
D'ÉPIDÉMIOLOGIE  
EN SANTÉ ANIMALE

2024

## Table des matières

I.	Contexte.....	3
A.	Historique de l'enquête.....	3
B.	Méthode de réalisation de l'enquête 2023-2024.....	4
1.	Flux de données.....	4
2.	Modalités d'invitation des apiculteurs à participer à l'enquête ENMHA.....	5
3.	Mode de recueil des données de l'enquête ENMHA.....	5
4.	Frise chronologique.....	5
C.	Objectifs de l'enquête.....	6
D.	Limites de l'enquête.....	6
E.	Définitions.....	7
1.	Mise en hivernage.....	7
2.	Sortie d'hivernage.....	7
3.	Cheptels déclarés et hivernés.....	7
4.	Des catégories de taille de cheptels.....	8
5.	Des indicateurs liés au déroulement de l'enquête.....	8
6.	De la mortalité hivernale et des pertes hivernales.....	9
II.	Résultats.....	10
A.	Indicateurs liés au déroulement de l'enquête.....	10
1.	Pourcentage de contactés.....	11
2.	Pourcentage de couverture brute.....	11
3.	Pourcentage de participation brute.....	13
4.	Pourcentage d'inclusion.....	15
5.	Pourcentage de couverture nette.....	15
6.	Pourcentage de participation nette.....	15
B.	Descriptif des populations.....	16
1.	Populations des apiculteurs déclarés et contactés.....	16
2.	Populations des apiculteurs répondants et inclus.....	16
3.	Comparaison des catégories de cheptel déclaré et hiverné des apiculteurs inclus.....	17
4.	Cheptels déclarés des apiculteurs inclus.....	22
5.	Caractéristiques des apiculteurs.....	26
C.	Caractéristiques de l'hivernage.....	35
1.	Durée de l'hivernage.....	35
2.	Emplacement de l'hivernage.....	37
3.	Caractéristiques des CEN hivernés.....	41

D.	Descriptif de la mortalité hivernale et des pertes hivernales .....	43
1.	Pourcentage de mortalité .....	43
2.	Pourcentage de pertes (CEN considérées comme morts, faibles, bourdonneux ou accidentés) .....	47
3.	Ressenti et analyse des apiculteurs concernant les pertes.....	56
E.	Mesures mises en place vis à vis de <i>Varroa destructor</i> .....	65
1.	Surveillance du niveau d'infestation de Varroa.....	65
2.	Moyens de lutte mis en place.....	69
III.	Bibliographie .....	84

Produit par Carole Forfait (carole.forfait@inrae.fr), épidémiologiste Plateforme ESA, INRAE-EPIA.

Co-auteurs (par ordre alphabétique) :

- Sophie Carles, épidémiologiste, Plateforme ESA, INRAE-EPIA.
- Céline Dupuy, épidémiologiste, Plateforme ESA, Anses laboratoire de Lyon.
- Marion Laurent, épidémiologiste, Plateforme ESA, Anses laboratoire de Sophia-Antipolis.

Contributeurs:

- Adeline Alexandre
- Quentin Bicego
- Julien Vallon

Relecteurs : le groupe de suivi ENMHA de la Plateforme ESA a relu le présent document.

Remerciements : Le groupe de travail remercie tous les apiculteurs qui ont pris le temps de répondre au questionnaire et aux organisations apicoles qui ont contribué à sensibiliser la filière à l'importance de la démarche.

### **Règles d'utilisation du présent document**

Tout ou partie du présent document peut être ré-utilisé à condition de préciser comme source la Plateforme ESA comme suit : « Source : Plateforme ESA ».

Aucun chiffre ne doit faire l'objet de modification sans l'accord préalable des co-auteurs du présent rapport. Aucun usage des chiffres, représentations ou autre contenu de ce rapport ne peut être fait à des fins commerciales ou de promotion de produits.

Toute anomalie ou suggestion d'amélioration est à faire remonter via le formulaire contact du site internet de la Plateforme ESA.

## I. Contexte

### A. Historique de l'enquête

Suite aux informations transmises par des apiculteurs et des organisations apicoles faisant état, dans plusieurs régions, d'une augmentation du taux de mortalité des colonies d'abeilles durant l'hiver 2017-2018, le ministère en charge de l'agriculture a décidé de lancer, auprès des apiculteurs, une enquête à l'échelle nationale (France métropolitaine et DROM-COM) pour estimer au mieux ce taux de mortalité. La Plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale (ESA) a été sollicitée afin de construire cette enquête. L'été 2018, un groupe de travail intitulé « Enquête nationale de mortalité hivernale des colonies d'abeilles » a été constitué. L'objectif principal de l'enquête ENMHA était d'estimer le taux de mortalité des colonies d'abeilles en sortie d'hivernage. D'autres

informations ont par ailleurs été collectées, notamment l'avis des apiculteurs sur les causes potentielles de cette mortalité et sur l'évolution de cette mortalité par rapport à l'hiver précédent. Cette enquête a été reconduite successivement pour les périodes hivernales 2018-2019 et 2019-2020 pour donner suite aux demandes du comité d'experts apicole du Cnopsav (Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale) en accord avec les besoins pour préciser la situation épidémiologique. En 2020, il a été décidé de pérenniser les travaux du groupe ENMHA et la conduite de cette enquête.

Pour l'enquête 2020-2021, des organisations apicoles départementales et régionales (ADA AURA en Auvergne Rhône-Alpes, ADAGE en Grand-Est et GDSA de l'Aveyron) ont chacune décidé de mutualiser leurs enquêtes locales avec l'enquête ENMHA dans une démarche d'optimisation et de convergence des enquêtes existantes. Elles ont été rejointes par GDS France en 2022.

A partir de la période hivernale 2021-2022, l'enquête a ciblé les apiculteurs de France métropolitaine uniquement. Les apiculteurs des DROM-COM ne sont plus invités, le questionnaire n'étant pas adapté aux particularités saisonnières de ces territoires.

## B. Méthode de réalisation de l'enquête 2023-2024

L'enquête ENMHA est conduite par le groupe de travail « ENMHA » de la Plateforme ESA. Ce groupe est animé par une experte technique de l'Anses. Il comprend des experts techniques de différents organismes : ADA, Anses, FNOSAD, FRGDS, GNTSA, INRAE, ITSAP, Ministère en charge de l'agriculture, SNGTV. Il assure un appui pour la réalisation des enquêtes, la valorisation des résultats et leur publication en lien avec l'équipe en appui transversal (équipe apportant un appui aux différents groupes de travail) de la Plateforme ESA.

### 1. Flux de données

Chaque année, les apiculteurs détenant au moins une colonie de production, essaims, ou nucléi d'abeilles ont l'obligation de se déclarer entre le 01/09 et le 31/12 de l'année en cours sur un site dédié de la DGAL (ministère en charge de l'agriculture) (<https://agriculture-portal.6tzen.fr/default/requests/Cerfa13995/>) ou par courrier avec un formulaire Cerfa papier (cerfa\_13995.declaration (service-public.fr)).

Les données collectées dans cette déclaration annuelle de détention et d'emplacement de ruches sont :

- le numéro d'identification de l'apiculteur pour une personne ayant déjà fait au moins une déclaration les années antérieures ;
- les informations sur le déclarant (dont coordonnées mail etc...) ;
- le nombre de colonies au sens de la somme des colonies de production, essaims, nucléi d'abeilles détenues le jour de la déclaration ;
- les communes sur lesquelles sont placées l'ensemble des colonies que ce soit des colonies de production, essaims ou nucléi ou sur lesquelles il est envisagé de les placer dans l'année suivant la déclaration.

Les données personnelles des déclarations de l'année 2023 servent uniquement pour la valorisation de cette enquête et sont analysées de manière anonyme.

Ces données sont transmises par la DGAL à l'animatrice du groupe ENMHA de la Plateforme ESA (Anses) et à l'équipe en appui transversal de la plateforme ESA (INRAE-Anses) qui se chargent du traitement des données dans le cadre de l'enquête (Figure 1).




Figure 1: Flux des données liées à l'enquête ENMHA lors de l'hiver N-1; N.

## 2. Modalités d'invitation des apiculteurs à participer à l'enquête ENMHA

A partir de cette base de données des déclarations des ruches transmise, la liste des apiculteurs de France métropolitaine invités à participer à l'enquête par messagerie électronique sur la base des apiculteurs :

- qui ont fourni une adresse de messagerie électronique valide

## 3. Mode de recueil des données de l'enquête ENMHA

Les apiculteurs reçoivent, après leur invitation à participer à l'enquête, un message électronique dans lequel se trouve un lien personnalisé les invitant à remplir en ligne le questionnaire de l'enquête ENMHA pré-complété avec certaines informations issues de la déclaration. Ils sont invités à remplir ce questionnaire de mars à mai 2024. Après vérification de certains critères notamment de cohérence, les données des apiculteurs inclus dans l'enquête sont analysées. Ce procédé évite à l'apiculteur de resaisir des informations déjà renseignées dans sa déclaration et garantit l'absence de doublon car il ne peut y avoir qu'une réponse à l'enquête par déclaration/apiculteur.

## 4. Frise chronologique

Dans cette Figure 2, il est possible de voir que la déclaration officielle peut se faire avant ou après le début de la période d'hivernage. Le début et la fin de la période d'hivernage peuvent fluctuer d'un apiculteur à un autre, d'une région à une autre.




Figure 2: Frise chronologique permettant de positionner la déclaration officielle, l'hivernage et l'enquête ENMHA.

### C. Objectifs de l'enquête

A partir d'un échantillon des apiculteurs déclarés en France métropolitaine, les objectifs initiaux (présents depuis la première enquête) et principaux de cette enquête sont de :

- décrire les taux de mortalité hivernale et les taux des pertes hivernales observées par les apiculteurs (en sortie d'hivernage) en ayant accès aux nombres de colonies de production/essaims/nucléi mis en hivernage et aux pertes observées en sortie d'hivernage.
- décrire la perception des apiculteurs sur l'évolution de cette mortalité/des pertes par rapport à l'année antérieure.
- décrire les facteurs que les apiculteurs pensent responsables de cette mortalité.

Cette enquête permet également de mieux connaître:

- les pratiques des apiculteurs (expérience, apiculture biologique...);
- l'hivernage des colonies (localisation, période, nourrissage...);
- la gestion du Varroa (évaluation de l'infestation, moyens de lutte...).

### D. Limites de l'enquête

L'étude ENMHA est une enquête transversale. Elle invite les apiculteurs détenant au moins une colonie à une période donnée dans l'année à participer. Ils sont questionnés en même temps sur la mortalité et sur l'exposition à des facteurs/pratiques potentiellement associés à cette dernière. Une limite de ce type d'étude est la difficulté à établir la relation temporelle entre une exposition et l'état des colonies (l'exposition précède-t-elle ou non la survenue de la mortalité ?). Ce critère de temporalité entre exposition et état de santé étudié est un des critères permettant de conclure à un lien de causalité. Ainsi les objectifs de l'enquête sont purement descriptifs et non pas explicatifs (ils ne permettent pas d'établir un lien de causalité avéré entre une exposition et la mortalité). Cette enquête peut éventuellement permettre d'identifier des hypothèses concernant les causes possibles de ces mortalités et pertes qu'il conviendrait ensuite d'investiguer via des études complémentaires.

De plus, l'enquête permet de dresser un état des lieux de la mortalité et des pertes déclarées au niveau national et régional par les apiculteurs en fonction de leurs lieux de résidence, qui peut différer du lieu de présence des leurs colonies/essaims/nucléi. L'enquête, en l'état, ne permet pas de localiser l'ensemble des lieux d'hivernage et d'avoir la mortalité et les pertes associées à chacun de ces lieux. Cette enquête exclut, de par sa conception, les apiculteurs n'ayant pas fait de déclaration de ruche en 2023. Cette enquête est facultative, tout apiculteur pouvant ou non la remplir. Les facteurs influençant la participation peuvent être multiples entraînant des biais difficiles à estimer sur les résultats obtenus. Les résultats de l'enquête concernant la mortalité hivernale sont présentés au regard de la taille de l'exploitation apicole et du département considérant que ces deux facteurs pourraient avoir un impact sur la mortalité hivernale. Aucune méthode de redressement de l'échantillon n'est appliquée volontairement car cela pourrait introduire un autre biais qu'il conviendrait au préalable d'évaluer ce qui n'a pas encore pu être fait.

## E. Définitions

### 1. Mise en hivernage

La mise en hivernage se caractérise par la dernière intervention automnale de l'apiculteur dans les ruches pour préparer les colonies de production/essaims/nucléi à l'hivernage (hors traitements et nourrissements complémentaires d'hiver).

### 2. Sortie d'hivernage

La sortie d'hivernage se caractérise par le moment où les mâles adultes apparaissent dans les colonies de production/essaims/nucléi.

### 3. Cheptels déclarés et hivernés

Le terme cheptel regroupe l'ensemble des colonies de production, des essaims et des nucléi de fécondation d'un apiculteur tels que définis dans l'enquête :

- Colonie de production : colonie d'abeilles suffisamment peuplée et possédant une reine en état de pondre (essaims ayant produit au cours de la saison et ruches partitionnées incluses).
- Essaim : colonie d'abeilles nouvellement ajoutée au rucher, qui n'a pas produit en 2023 mais destinée à produire en 2024. L'essaim peut être naturel ou artificiellement créé par l'apiculteur.
- Nucléi de fécondation : petite colonie destinée à l'hivernage de la reine.

L'unité de valeur du cheptel est appelée CEN (colonie de production/essaim/nucléi).

Dans cette enquête, nous disposons de deux informations différentes concernant le nombre de CEN des apiculteurs :

- l'information renseignée par l'apiculteur au moment de la déclaration qui n'a pu être réalisée que de septembre à décembre 2022.
- l'information concernant le nombre de CEN au moment de la mise en hivernage renseignée par l'apiculteur lorsqu'il remplit l'enquête ENMHA entre mars et mai 2023. Le nombre de CEN des apiculteurs permet de déterminer dans quelle catégorie de taille de cheptel ils se situent. Cela fait l'hypothèse que des apiculteurs de catégories identiques auraient des profils plus proches en matière de pratique apicole que des apiculteurs de catégories différentes.

Ainsi, dans ce rapport nous nous intéressons aux catégories de cheptels déclarés et aux catégories de cheptels hivernés en fonction des objectifs d'analyse.

Les caractéristiques des apiculteurs peuvent être analysées selon deux objectifs différents :

- le premier objectif est de comparer la population des apiculteurs déclarés et répondants afin de voir par exemple s'il y a une sous-représentation de certaines catégories de taille de cheptel déclarée chez les répondants. Ainsi, il sera possible de cibler les éventuelles campagnes d'information en faveur de la participation à l'enquête ENMHA. Les caractéristiques des répondants pourront être présentées en fonction de la taille de cheptel déclarés lors de la déclaration qui est la base officielle d'identification des apiculteurs. La taille de cheptel issue de la déclaration est aussi la seule caractéristique commune à ces deux sous-populations (répondants; non-répondants) permettant un comparatif. La taille de cheptel hiverné n'est en effet pas connue pour les non-répondants car elle n'est pas demandée dans la déclaration de ruche.
- le deuxième objectif est de connaître les caractéristiques des répondants inclus en fonction de la taille de cheptels mis en hivernage afin d'essayer de mieux appréhender la mortalité et les pertes hivernales en fonction de ces caractéristiques.

#### 4. Des catégories de taille de cheptels

Les exploitants apicoles cotisent à la MSA (Mutualité sociale agricole) pour leur couverture sociale (maladie, accident, retraite...) en fonction du nombre de ruches qu'ils possèdent. De plus, les apiculteurs étaient soumis jusqu'en 2016 à une fiscalité sur le nombre de ruches possédées. Même si cette ancienne fiscalité n'est plus appliquée, on retrouve des informations contradictoires sur internet qui peuvent faire croire qu'elle est toujours d'actualité. Ainsi, nous utilisons ces éléments concernant l'ancienne catégorisation fiscale des exploitations et les règles de cotisation à la MSA pour créer quatre catégories en fonction de la taille de cheptel des apiculteurs :

- [1-10] CEN: apiculteur non soumis à l'ancienne fiscalité
- [11-49] CEN: apiculteur ne devant pas s'acquitter d'une cotisation MSA
- [50-199] CEN: apiculteur "cotisant solidaire" MSA
- [ $\geq$  200] CEN: apiculteur assujetti en qualité d'exploitant agricole MSA

Les catégories [50-199] CEN et [ $\geq$  200] CEN, qui correspondent aux apiculteurs considérés comme professionnels sont parfois regroupées en une seule catégorie  $\geq$ 50 CEN. La catégorie de  $\geq$ 200 CEN est en effet parfois peu représentée dans certaines régions ou départements.

#### 5. Des indicateurs liés au déroulement de l'enquête

Plusieurs indicateurs sont utilisés pour évaluer le déroulement de l'enquête :

- Le pourcentage de contactés

En effet, tous les apiculteurs déclarés n'ont pas donné leur accord pour être contactés ou ont fourni une adresse de messagerie invalide. Ainsi, on a :

$$\text{Pourcentage de contactés} = \frac{\text{Nbre d'apiculteurs contactés}}{\text{Nbre d'apiculteurs déclarés}} \times 100$$

- Le pourcentage de couverture brute

Il s'agit du pourcentage d'apiculteurs ayant répondu à l'enquête par rapport aux apiculteurs déclarés. Ainsi on a :

$$\text{Pourcentage de couverture brute} = \frac{\text{Nbre d'apiculteurs répondants}}{\text{Nbre d'apiculteurs déclarés}} \times 100$$

- Le pourcentage de participation brute

Il s'agit du pourcentage d'apiculteurs ayant répondu à l'enquête par rapport aux apiculteurs contactés. Ainsi on a :



$$\text{Pourcentage de participation brute} = \frac{\text{Nbre d'apiculteurs répondants}}{\text{Nbre d'apiculteurs contactés}} \times 100$$

- Le pourcentage d'inclusion

Il s'agit du pourcentage d'apiculteurs ayant répondu à l'enquête avec des réponses valides et pouvant donc être inclus (les critères d'inclusion étant que les chiffres de sortie d'hivernage soient cohérents avec ceux déclarés pour le début d'hivernage) dans l'analyse finale par rapport aux apiculteurs ayant répondu à l'enquête. Ainsi on a :

$$\text{Pourcentage d'inclusion} = \frac{\text{Nbre d'apiculteurs répondants inclus}}{\text{Nbre d'apiculteurs répondants}} \times 100$$

- Le pourcentage de couverture nette

Il s'agit du pourcentage d'apiculteurs répondants inclus dans l'enquête par rapport aux apiculteurs déclarés. Ainsi on a :

$$\text{Pourcentage de couverture nette} = \frac{\text{Nbre d'apiculteurs répondants inclus}}{\text{Nbre d'apiculteurs déclarés}} \times 100$$

- Le pourcentage de participation nette

Il s'agit du pourcentage d'apiculteurs répondants inclus par rapport aux apiculteurs contactés. Ainsi on a :

$$\text{Pourcentage de participation nette} = \frac{\text{Nbre d'apiculteurs répondants inclus}}{\text{Nbre d'apiculteurs contactés}} \times 100$$

## 6. De la mortalité hivernale et des pertes hivernales

La mortalité hivernale correspond aux cas où une colonie de production/essaïm/nucléï, à la sortie de l'hivernage était dans l'une de ces deux situations :

- la ruche ne contenait que des abeilles mortes,
- la ruche était vide.

Les pertes hivernales englobent à la fois :

- la mortalité hivernale,
- les pertes accidentelles (pertes liées aux inondations, feux, sangliers, vols, étouffements dû à la neige etc...)
- les non-valeurs sont des colonies ou essaïms qui, en sortie d'hivernage, sont :
  - faibles c'est à dire pas capables de revenir en production au printemps sans l'intervention de l'apiculteur (moins de 2 000 abeilles). Les nucléï de fécondation ne sont pas considérés comme des non-valeurs du fait de leur taille.
  - orphelin(e)s ou bourdonneux(se) c'est à dire qui sont vivant(e)s mais avec des problèmes de reine (absence de reine et/ou présence de couvain de mâles uniquement et en grande quantité).

Le pourcentage de mortalité hivernale est calculé de la façon suivante :

$$\begin{aligned} & \text{Pourcentage de mortalité hivernale} \\ &= \frac{\text{Nbre de CEN mort chez les apiculteurs inclus}}{\text{Nbre de CEN mis en hivernage chez les apiculteurs inclus}} \times 100 \end{aligned}$$

Le pourcentage de pertes hivernales est calculé de la façon suivante :

$$\begin{aligned} & \text{Pourcentage de pertes hivernales} \\ &= \frac{\text{Nbre de CEN considérés comme pertes chez les apiculteurs inclus}}{\text{Nbre de CEN mis en hivernage chez les apiculteurs inclus}} \times 100 \end{aligned}$$

## II. Résultats

### A. Indicateurs liés au déroulement de l'enquête




Figure 3: Logigramme reprenant les différentes populations au cours du processus menant de la population des apiculteurs déclarés à celle des apiculteurs inclus dans les résultats de l'enquête ENMHA au niveau national.




Figure 4: Logigramme reprenant les différentes populations au cours du processus menant de la population des apiculteurs déclarés à celle des apiculteurs inclus dans les résultats de l'enquête ENMHA au niveau régional.

### 1. Pourcentage de contactés

Parmi les 60 548 apiculteurs déclarés au niveau national 96,3 % ont pu être contactés et parmi les 2 936 apiculteurs déclarés dans la région Normandie, 96,2 % ont pu être contactés.

### 2. Pourcentage de couverture brute

Parmi les 60 548 apiculteurs déclarés, 27,8 % ont répondu à l'enquête au niveau national (16 809 apiculteurs) et parmi les 2 936 apiculteurs déclarés dans la région Normandie, 29,2 % ont répondu à l'enquête au niveau régional (857 apiculteurs).

En ce qui concerne le taux de couverture brute par département de la région Normandie, les résultats sont présentés dans la Figure 5 :




Figure 5: Pourcentages de couverture brute de l'enquête (pourcentages d'apiculteurs répondants par rapport aux apiculteurs déclarés) par département de la région. Les lignes rouge et verte correspondent respectivement aux pourcentages national et régional et permettent la comparaison avec les pourcentages départementaux.

Les résultats en fonction de la catégorie de cheptel déclaré et par département sont présentés dans la Figure 6 :




Figure 6: Pourcentages de couverture brute de l'enquête (pourcentage d'apiculteurs répondants par rapport aux apiculteurs déclarés) par département de la région pour les catégories de taille de cheptel déclaré [1-10], [11-49] et  $\geq 50$  CEN. Les lignes rouge et verte correspondent respectivement aux pourcentages national et régional et permettent la comparaison avec les pourcentages départementaux.

La figure ci-dessus permet d'identifier les types d'apiculteurs nécessitant une sensibilisation plus importante pour répondre à l'enquête.

### 3. Pourcentage de participation brute

Parmi les 58 313 apiculteurs contactés au niveau national, 28,8 % ont répondu à l'enquête ENMHA (16 809 apiculteurs) et parmi les 2 824 apiculteurs contactés dans la région Normandie, 30,3 % ont répondu à l'enquête (857 apiculteurs). De même, le pourcentage de participation brute par département est représenté par la Figure 7 :




Figure 7: Participation brute par département de la région (pourcentages d'apiculteurs répondants par rapport aux apiculteurs contactés). Les lignes rouge et verte correspondent respectivement aux pourcentages national et régional et permettent la comparaison avec les pourcentages départementaux.

Le taux de participation brute par département de résidence de l'apiculteur en fonction de la taille de cheptel déclaré est présenté par la figure suivante.




Figure 8: Représentation du nombre d'apiculteurs ayant fait une déclaration avec en gris ceux qui n'ont pas participé à l'enquête ENMHA, et en violet ceux qui y ont répondu par taille de cheptel déclaré et par département. Le pourcentage de participation brute est précisé pour chaque catégorie dans chaque département.

#### 4. Pourcentage d'inclusion

Parmi les 16 809 apiculteurs qui ont répondu à l'enquête au niveau national, 84,7 % ont été inclus dans le jeu de données final après application des règles de nettoyage et validation de la cohérence des données (14 244 réponses). Parmi les 857 apiculteurs qui ont répondu à l'enquête dans la région Normandie, 85,6 % ont été inclus dans le jeu de données final (734 réponses).

#### 5. Pourcentage de couverture nette

Ainsi, les 14 244 apiculteurs répondants avec des données qui satisfont les critères d'inclusion représentent 23,5 % des 60 548 déclarations faites au niveau national. Pour la région Normandie, ce pourcentage est de 25 % (734 apiculteurs inclus / 2 936 apiculteurs déclarés dans la région).

#### 6. Pourcentage de participation nette

Au niveau national, parmi les 58 313 apiculteurs contactés, 14 244 apiculteurs ont répondu et ont été inclus soit une participation nette de 24,4 %. Cette participation nette est pour la région Normandie de 26 % (734 apiculteurs inclus sur 2 824 contactés).

## B. Descriptif des populations

Dans cette partie, les populations d'apiculteurs déclarés, contactés, répondants et inclus sont présentées en fonction de la catégorie de cheptel déclaré qui est connue pour toutes ces populations. Pour les populations des répondants et des inclus, il est également possible de les décrire en fonction de la taille de cheptel hiverné.

### 1. Populations des apiculteurs déclarés et contactés

Dans le tableau suivant, il est possible de voir quelles sont les catégories de cheptel déclaré des apiculteurs qui n'ont pas pu être contactés en comparant les effectifs des apiculteurs déclarés et contactés au niveau national puis au niveau régional. Il est également possible de comparer les pourcentages des apiculteurs des différentes catégories de cheptel déclaré au niveau régional par rapport au niveau national.

*Tableau 1: Nombres et pourcentages d'apiculteurs déclarés et contactés en fonction de la taille du cheptel déclaré au niveau régional et national lors de l'enquête ENMHA 2023-2024. La catégorie des  $\geq 50$  a été divisée en deux sous-catégories qui sont présentées en grisé.*

Catégorie de taille de cheptel déclaré	Apiculteurs déclarés Nb (%)		Apiculteurs contactés Nb (%)		Apiculteurs non contactés Nb (%)	
	régional	national	régional	national	régional	national
[1-10]	2 173 (74 %)	42 528 (70,2 %)	2 095 (74,2 %)	40 933 (70,2 %)	78 (69,64 %)	1 595 (70,79 %)
[11-49]	632 (21,5 %)	12 688 (21 %)	599 (21,2 %)	12 185 (20,9 %)	33 (29,46 %)	503 (22,33 %)
$\geq 50$	131 (4,46 %)	5 332 (8,81 %)	130 (4,6 %)	5 177 (8,88 %)	1 (0,89 %)	155 (6,88 %)
[50-199]	77 (2,62 %)	3 106 (5,13 %)	77 (2,73 %)	3 026 (5,19 %)	0 (0 %)	80 (3,55 %)
$\geq 200$	54 (1,84 %)	2 226 (3,68 %)	53 (1,88 %)	2 151 (3,69 %)	1 (0,89 %)	75 (3,33 %)
<b>Total</b>	<b>2 936 (100 %)</b>	<b>60 548 (100 %)</b>	<b>2 824 (100 %)</b>	<b>58 313 (100 %)</b>	<b>112 (100 %)</b>	<b>2 235 (100 %)</b>

### 2. Populations des apiculteurs répondants et inclus

#### a) En ce qui concerne les catégories de cheptel déclaré

Dans le tableau suivant, sont représentées les catégories de cheptel déclaré des apiculteurs répondants et inclus au niveau régional et national. Il est ainsi possible de voir dans quelles catégories se situent les apiculteurs répondants qui n'ont pas été inclus.



Tableau 2: Nombres et pourcentages d'apiculteurs répondants et inclus en fonction de la catégorie de la taille du cheptel déclaré au niveau régional et national lors de l'enquête ENMHA 2023-2024. La catégorie des  $\geq 50$  a été divisée en deux sous-catégories qui sont présentées en grisé.

Catégorie de taille de cheptel déclaré	Apiculteurs répondants Nb (%)		Apiculteurs inclus Nb (%)	
	régional	national	régional	national
[1-10]	677 (79 %)	13 028 (77,5 %)	591 (80,5 %)	11 244 (78,9 %)
[11-49]	151 (17,6 %)	3 016 (17,9 %)	122 (16,6 %)	2 447 (17,2 %)
$\geq 50$	29 (3,38 %)	765 (4,55 %)	21 (2,86 %)	553 (3,88 %)
[50-199]	20 (2,33 %)	479 (2,85 %)	14 (1,91 %)	347 (2,44 %)
$\geq 200$	9 (1,05 %)	286 (1,7 %)	7 (0,954 %)	206 (1,45 %)
<b>Total</b>	<b>857 (100 %)</b>	<b>16 809 (100 %)</b>	<b>734 (100 %)</b>	<b>14 244 (100 %)</b>

*b) En ce qui concerne les catégories de cheptel hiverné*

De même dans le tableau suivant, il est possible de voir quelles sont les catégories de cheptel hiverné des apiculteurs répondants et inclus au niveau régional et national.

Tableau 3: Nombres et pourcentages d'apiculteurs répondants et inclus (réponses répondant aux critères de non exclusion) en fonction de la catégorie de la taille du cheptel hiverné au niveau régional et national lors de l'enquête ENMHA 2023-2024. La catégorie des  $\geq 50$  a été divisée en deux sous-catégories qui sont présentées en grisé.

Catégorie de taille de cheptel hiverné	Apiculteurs répondants Nb (%)		Apiculteurs inclus Nb (%)	
	régional	national	régional	national
[1-10]	558 (72,4 %)	10 840 (71,5 %)	532 (72,5 %)	10 191 (71,5 %)
[11-49]	189 (24,5 %)	3 576 (23,6 %)	179 (24,4 %)	3 361 (23,6 %)
$\geq 50$	24 (3,11 %)	739 (4,88 %)	23 (3,13 %)	692 (4,86 %)
[50-199]	15 (1,95 %)	506 (3,34 %)	14 (1,91 %)	471 (3,31 %)
$\geq 200$	9 (1,17 %)	233 (1,54 %)	9 (1,23 %)	221 (1,55 %)
<b>Total</b>	<b>857 (100 %)</b>	<b>16 809 (100 %)</b>	<b>734 (100 %)</b>	<b>14 244 (100 %)</b>

### 3. Comparaison des catégories de cheptel déclaré et hiverné des apiculteurs inclus

Afin de mieux comprendre à quoi correspondent les catégories de cheptel déclaré et hiverné, il est intéressant de voir quand ont été faites les déclarations, car les apiculteurs doivent renseigner la taille de leur cheptel au moment du remplissage de la déclaration, ce qui se fait donc à un moment plus ou moins éloigné du moment de la mise en hivernage.




Figure 9: Nombre de déclarations des apiculteurs inclus lors de l'enquête ENMHA 2023-2024 par mois de déclaration en 2023 au niveau national (en haut) et régional (en bas). Les pourcentages sont précisés pour chaque mois en fonction de l'ensemble des apiculteurs inclus. Les valeurs NA correspondent aux déclarations réalisées en format papier. Pour celles-ci la date de déclaration n'est pas connue, elles sont enregistrées en masse a posteriori dans l'outil informatique.

Les 36 valeurs NA correspondent aux déclarations faites en format papier et saisies par la suite par la DGAL sur la plateforme de télédéclaration en janvier 2023 au niveau national (3 déclarations en format papier au niveau de la région Normandie). Par défaut, la date de déclaration correspond à

la date de saisie sur la plateforme de télédéclaration. Ainsi, les dates de réalisation des déclarations faites en format papier ne sont pas connues.




Figure 10: Nombre d'apiculteurs inclus en fonction du mois de mise en hivernage déclaré dans l'enquête ENMHA 2023-2024 au niveau national (en haut) et régional (en bas). Les pourcentages sont précisés pour chaque mois en fonction de l'ensemble des apiculteurs inclus NA : Valeur non attribuée dans le questionnaire.

Dans la figure présentant une approximation du délai entre le mois de déclaration et le mois de mise en hivernage, les déclarations saisies manuellement en janvier par la DGAI ne sont pas prises en compte. En ce qui concerne l'hivernage, seul le mois de mise en hivernage est connu, le délai entre la déclaration et l'hivernage reste donc approximatif.




Figure 11: Nombre d'apiculteurs inclus en fonction du délai approximatif entre le mois de la déclaration et le mois de mise en hivernage au niveau national (en haut) et régional (en bas) dans l'enquête ENMHA 2023-2024. Tous les délais positifs, à droite de la ligne verticale rouge,

correspondent aux cas où l'hivernage a débuté avant la déclaration. Tous les délais négatifs, à gauche de la ligne verticale bleue, correspondent aux cas où l'hivernage a débuté après la déclaration. Les NA correspondent aux cas où les délais n'ont pas pu être évalués.

La Figure 12 permet de visualiser la correspondance entre les catégories de taille de cheptel déclaré et les catégories de taille de cheptel hiverné.




Figure 12: Pourcentages et effectifs d'apiculteurs dans les différentes catégories de cheptel déclaré en fonction de la catégorie de cheptel hiverné au niveau national.

Au niveau national, on observe que pour une majorité d'apiculteurs la catégorie de cheptel déclaré est identique à la catégorie de cheptel hiverné. Les différences observées sont plus souvent dans le sens d'un nombre de CEN déclaré inférieur à celui hiverné (cas sous la diagonale orange).




Figure 13: Pourcentages et effectifs d'apiculteurs dans les différentes catégories de cheptel déclaré en fonction de la catégorie de cheptel hiverné au niveau régional.

#### 4. Cheptels déclarés des apiculteurs inclus

Les apiculteurs répondants inclus dans l'enquête ENMHA ont déclaré 214 308 CEN en 2023 soit 12,4% du total des CEN déclarés en métropole en 2023 (1 728 866 CEN). Dans l'enquête, ces apiculteurs ont déclaré avoir mis en hivernage 253 050 CEN soit 118 % des CEN déclarés par les apiculteurs inclus dans l'enquête ENMHA.

Au niveau de la région Normandie, les apiculteurs répondants inclus dans l'enquête ont déclaré 9 636 CEN en 2023 soit 18,8 % des CEN déclarés par les apiculteurs inclus en Normandie (51 263 CEN). Dans l'enquête, ces apiculteurs ont déclaré avoir mis en hivernage 12 451 CEN soit 129 % des CEN déclarés par les apiculteurs inclus en Normandie. Le tableau suivant présente les différents résultats (nombre de cheptels et %) en fonction de la taille de cheptel déclaré.

Tableau 4: Taille de cheptel (en CEN) déclaré pour la population totale des déclarants ainsi que taille de cheptel (en CEN) déclaré et taille de cheptel (en CEN) hiverné pour la population des apiculteurs inclus dans l'enquête ENMHA. La catégorie des >=50 a été divisée en deux sous-catégories qui sont présentées en grisé.


Catégorie de taille de cheptel déclaré	Population des déclarants		Population des répondants inclus			
	CEN déclarés Nb (%)		CEN déclarés Nb (%)		CEN hivernés Nb (%)	
	régional	national	régional	national	régional	national
[1-10]	10 667 (20,8 %)	206 056 (11,9 %)	2 787 (28,9 %)	51 244 (23,9 %)	3 476 (27,9 %)	64 097 (25,3 %)
[11-49]	13 423 (26,2 %)	281 402 (16,3 %)	2 257 (23,4 %)	49 433 (23,1 %)	2 635 (21,2 %)	60 565 (23,9 %)
>=50	27 173 (53 %)	1 241 408 (71,8 %)	4 592 (47,7 %)	113 631 (53 %)	6 340 (50,9 %)	128 388 (50,7 %)
[50-199]	7 303 (14,2 %)	317 344 (18,4 %)	1 199 (12,4 %)	32 644 (15,2 %)	1 642 (13,2 %)	37 808 (14,9 %)
>=200	19 870 (38,8 %)	924 064 (53,4 %)	3 393 (35,2 %)	80 987 (37,8 %)	4 698 (37,7 %)	90 580 (35,8 %)
<b>Total</b>	<b>51 263 (100 %)</b>	<b>1 728 866 (100 %)</b>	<b>9 636 (100 %)</b>	<b>214 308 (100 %)</b>	<b>12 451 (100 %)</b>	<b>253 050 (100 %)</b>

Tableau 5: Médianes, valeurs minimales et maximales du nombre de CEN par apiculteur déclarés, inclus (réponses valides) et hivernés (chez les inclus) au niveau régional et national en fonction de la catégorie de la taille du cheptel déclaré lors de l'enquête ENMHA 2023-2024. La catégorie des >=50 a été divisée en deux sous-catégories qui sont présentées en grisé.

Catégorie de taille de cheptel déclaré	Population des déclarants		Population des répondants inclus			
	Distribution des CEN déclarés par apiculteur Médiane [min;max]		Distribution des CEN déclarés par apiculteur Médiane [min;max]		Distribution des CEN hivernés par apiculteur Médiane [min;max]	
	régional	national	régional	national	régional	national
[1-10]	4 [1 - 10]	4 [1 - 10]	4 [1 - 10]	4 [1 - 10]	5 [1 - 24]	4 [1 - 65]
[11-49]	18 [11 - 49]	19 [11 - 49]	16 [11 - 49]	17 [11 - 49]	18.5 [1 - 58]	20 [1 - 250]
>=50	150 [50 - 181]	160 [50 - 3779]	100 [50 - 181]	132 [50 - 324]	130 [26 - 2362]	150 [8 - 3324]
[50-199]	84 [50 - 190]	90 [50 - 199]	80.5 [50 - 180]	80 [50 - 198]	97.5 [26 - 360]	95 [8 - 360]

	Population des déclarants		Population des répondants inclus			
	Distribution des CEN déclarés par apiculteur Médiane [min;max]		Distribution des CEN déclarés par apiculteur Médiane [min;max]		Distribution des CEN hivernés par apiculteur Médiane [min;max]	
Catégorie de taille de cheptel déclaré	régional	national	régional	national	régional	national
>=200	305 [200 - 1 181]	325 [200 - 3 779]	400 [206 - 1 181]	301 [200 - 3 324]	400 [206 - 2 362]	350 [60 - 3 324]
<b>Total</b>	<b>6 [1 - 1 181]</b>	<b>6 [1 - 3 779]</b>	<b>5 [1 - 1 181]</b>	<b>5 [1 - 3 324]</b>	<b>6 [1 - 2 362]</b>	<b>6 [1 - 3 324]</b>

Les Figure 14, Figure 15, Figure 16 permettent de visualiser les résultats présentés dans le tableau précédent.








Figure 15: Diagrammes en violon, combinaison entre diagramme en boîte, Box Plot, et diagramme d'estimation de densité qui affiche les pics de données. Ainsi sont représentées les valeurs médianes, minimales et maximales du nombre de CEN par apiculteurs que ce soit déclarés, inclus (réponses valides) et hivernés (chez les inclus) au niveau régional et national pour la catégorie de la taille du cheptel déclaré [11-49] lors de l'enquête ENMHA 2023-2024.




Figure 16: Diagrammes en violon, combinaison entre diagramme en boîte, Box Plot, et diagramme d'estimation de densité qui affiche les pics de données. Ainsi sont représentées les valeurs médianes, minimales et maximales du nombre de CEN par apiculteurs que ce soit déclarés, inclus (réponses valides) et hivernés (chez les inclus) au niveau régional et national pour la catégorie de la taille du cheptel déclaré  $\geq 50$  lors de l'enquête ENMHA 2023-2024.

Ainsi, on peut voir que pour les apiculteurs ayant une taille de cheptel déclaré  $\geq 50$ , la médiane du nombre de CEN hiverné par apiculteur est de 150 au niveau national, c'est à dire que 50% des apiculteurs au niveau national de cette catégorie ont plus de 150 CEN hivernés et que 50% ont moins de 150 CEN avec comme valeur minimale 8 CEN et valeur maximale de 3324 CEN.

## 5. Caractéristiques des apiculteurs

Dans cette partie, sont présentées quelques caractéristiques des apiculteurs:

- le nombre et le pourcentage d'apiculteurs qui adhèrent à une organisation dispensant des conseils en apiculture,
- l'ancienneté en année d'apiculture des apiculteurs
- le nombre d'apiculteurs qui ont répondu être en apiculture biologique.
- le nombre d'apiculteurs qui ont transhumé leurs colonies au moins une fois pour produire du miel ou pour la pollinisation.

Deux cas de figure vont être étudiés en fonction de deux objectifs différents :

- Caractéristiques des apiculteurs répondants en fonction de la taille de cheptel déclaré
- Caractéristiques des apiculteurs inclus en fonction de la taille de cheptel hiverné

a) *Caractéristiques des apiculteurs répondants en fonction de la taille de cheptel déclaré*

Il est intéressant de regarder les caractéristiques des apiculteurs répondants en fonction de la taille de cheptel déclaré afin de pouvoir éventuellement cibler les campagnes d'information concernant l'enquête ENMHA.

Le tableau suivant résume les caractéristiques des répondants par catégorie de taille de cheptel déclaré au niveau régional et national.

*Tableau 6: Caractéristiques des apiculteurs répondants au niveau régional et national en fonction de la catégorie de la taille du cheptel déclaré lors de l'enquête ENMHA 2023-2024. La catégorie des >=50 a été divisée en deux sous-catégories qui sont présentées en grisé. En ce qui concerne les adhérents, cela prend en compte les adhésions à une organisation dispensant des conseils en apiculture.*

	Catégorie de taille de cheptel déclaré										Toutes catégories confondues	
	[1-10]		[11-49]		>=50		[50-199]		>=200			
Caractéristiques	régional	national	régional	national	régional	national	régional	national	régional	national	régional	national
Nb d'adhérents	369	7 253	92	1 915	15	417	10	262	5	155	<b>476</b>	<b>9 585</b>
%	54,5 %	55,7 %	60,9 %	63,5 %	51,7 %	54,5 %	50 %	54,7 %	55,6 %	54,2 %	<b>55,5 %</b>	<b>57 %</b>
Nb de non-adhérents	171	3 030	16	304	3	70	1	44	2	26	<b>190</b>	<b>3 404</b>
%	25,3 %	23,3 %	10,6 %	10,1 %	10,3 %	9,15 %	5 %	9,19 %	22,2 %	9,09 %	<b>22,2 %</b>	<b>20,3 %</b>
Nb de non-répondants	137	2 745	43	797	11	278	9	173	2	105	<b>191</b>	<b>3 820</b>
%	20,2 %	21,1 %	28,5 %	26,4 %	37,9 %	36,3 %	45 %	36,1 %	22,2 %	36,7 %	<b>22,3 %</b>	<b>22,7 %</b>
Ancienneté Nb de 0 à 1 an	93	1 675	5	45	0	16	0	15	0	1	<b>98</b>	<b>1 736</b>
%	13,7 %	12,9 %	3,31 %	1,49 %	0 %	2,09 %	0 %	3,13 %	0 %	0,35 %	<b>11,4 %</b>	<b>10,3 %</b>
Nb de 2 à 5 ans	273	4 700	32	589	3	88	2	75	1	13	<b>308</b>	<b>5 377</b>
%	40,3 %	36,1 %	21,2 %	19,5 %	10,3 %	11,5 %	10 %	15,7 %	11,1 %	4,55 %	<b>35,9 %</b>	<b>32 %</b>
Nb de 6 - 10 ans	78	1 576	27	484	1	94	1	56	0	38	<b>106</b>	<b>2 154</b>
%	11,5 %	12,1 %	17,9 %	16 %	3,45 %	12,3 %	5 %	11,7 %	0 %	13,3 %	<b>12,4 %</b>	<b>12,8 %</b>

	Catégorie de taille de cheptel déclaré										Toutes catégories confondues	
	[1-10]		[11-49]		>=50		[50-199]		>=200			
Caractéristiques	régional	national	régional	national	régional	national	régional	national	régional	national	régional	national
Nb de > 10 ans	109	2 608	45	1 137	14	298	8	167	6	131	<b>168</b>	<b>4 043</b>
%	16,1 %	20 %	29,8 %	37,7 %	48,3 %	39 %	40 %	34,9 %	66,7 %	45,8 %	<b>19,6 %</b>	<b>24,1 %</b>
Nb de non répondants	124	2 469	42	761	11	269	9	166	2	103	<b>177</b>	<b>3 499</b>
%	18,3 %	19 %	27,8 %	25,2 %	37,9 %	35,2 %	45 %	34,7 %	22,2 %	36 %	<b>20,7 %</b>	<b>20,8 %</b>
Nb apiculteurs bio	2	27	0	21	4	97	2	45	2	52	<b>6</b>	<b>145</b>
%	0,295 %	0,207 %	0 %	0,696 %	13,8 %	12,7 %	10 %	9,39 %	22,2 %	18,2 %	<b>0,7 %</b>	<b>0,863 %</b>
Nb apiculteurs non bio	550	10 531	109	2 234	14	399	9	268	5	131	<b>673</b>	<b>13 164</b>
%	81,2 %	80,8 %	72,2 %	74,1 %	48,3 %	52,2 %	45 %	55,9 %	55,6 %	45,8 %	<b>78,5 %</b>	<b>78,3 %</b>
Nb non-répondants	125	2 470	42	761	11	269	9	166	2	103	<b>178</b>	<b>3 500</b>
%	18,5 %	19 %	27,8 %	25,2 %	37,9 %	35,2 %	45 %	34,7 %	22,2 %	36 %	<b>20,8 %</b>	<b>20,8 %</b>
Nb apiculteurs transhumants	17	790	9	518	3	290	1	145	2	145	<b>29</b>	<b>1 598</b>
%	2,51 %	6,06 %	5,96 %	17,2 %	10,3 %	37,9 %	5 %	30,3 %	22,2 %	50,7 %	<b>3,38 %</b>	<b>9,51 %</b>
Nb apiculteurs non-transhumants	534	9 762	100	1 737	15	206	10	168	5	38	<b>649</b>	<b>11 705</b>
%	78,9 %	74,9 %	66,2 %	57,6 %	51,7 %	26,9 %	50 %	35,1 %	55,6 %	13,3 %	<b>75,7 %</b>	<b>69,6 %</b>
Nb apiculteurs non-répondants	126	2 476	42	761	11	269	9	166	2	103	<b>179</b>	<b>3 506</b>

	Catégorie de taille de cheptel déclaré										Toutes catégories confondues	
	[1-10]		[11-49]		>=50		[50-199]		>=200			
Caractéristiques	régional	national	régional	national	régional	national	régional	national	régional	national	régional	national
%	18,6 %	19 %	27,8 %	25,2 %	37,9 %	35,2 %	45 %	34,7 %	22,2 %	36 %	20,9 %	20,9 %
TOTAL EFFECTIF	677	13 028	151	3 016	29	765	20	479	9	286	857	16 809

#### (1) Adhésion à une organisation dispensant des conseils en apiculture

Au niveau national, 57 % des apiculteurs répondants ont répondu être adhérent à une organisation dispensant des conseils en apiculture soit 9 585 apiculteurs.

En région Normandie, 55,5 % des apiculteurs répondants ont répondu être adhérent à une organisation dispensant des conseils en apiculture soit 476 apiculteurs.

#### (2) Années d'ancienneté des apiculteurs

En ce qui concerne les années d'ancienneté en apiculture des répondants, la distribution des valeurs a les caractéristiques suivantes :

La figure suivante permet de visualiser la distribution des valeurs d'ancienneté en apiculture des apiculteurs répondants au niveau régional et national en fonction de la catégorie de taille de cheptel déclaré.




Figure 17: Diagrammes en violon qui sont une combinaison entre un diagramme en boîte, Box Plot, et un diagramme d'estimation de densité qui affiche les pics de données. Ainsi sont représentées les valeurs médianes, minimales, maximales des années d'ancienneté en apiculture. La figure de gauche reprend les diagrammes par catégories de taille de cheptel déclaré des apiculteurs répondants dans l'enquête ENMHA au niveau régional et à droite au niveau national. Les valeurs des médianes sont précisées en rouge.

Au niveau national, la médiane des années d'ancienneté des apiculteurs répondants toute taille d'exploitation confondue est de 5 ans, ainsi la moitié des répondants ont moins de 5 ans d'ancienneté. Les premier et troisième quartiles sont respectivement de 3 ans et 10 ans.

Au niveau régional, la médiane des années d'ancienneté des apiculteurs répondants toute taille d'exploitation confondue est de 5 ans d'ancienneté. Les premier et troisième quartiles sont respectivement de 2,8 ans et de 9 ans.

### (3) Apiculture biologique

On s'attendrait à n'avoir aucun "apiculture biologique" dans les apiculteurs avec une taille de cheptel déclaré [1-10] car avoir un label "agriculture biologique" avec cette taille de cheptel ne semble pas réaliste. Ainsi, certains apiculteurs avec une taille de cheptel déclaré [1-10] ont peut-être interprété cette question comme "Avez-vous des pratiques apicoles biologiques" et non une "labellisation agriculture biologique".

Au niveau national, 0,863 % des apiculteurs répondants toute taille d'exploitation confondue ont répondu être en "apiculture biologique" soit 145 apiculteurs.

En région Normandie, 0,7 % des apiculteurs répondants toute taille d'exploitation confondue ont répondu être en "apiculture biologique" soit 6 apiculteurs.

#### (4) Transhumance

A la question “Avez-vous transhumé vos colonies au moins une fois pour produire du miel ou pour la pollinisation ?”, 9,51 % des apiculteurs répondants toute taille d’exploitation confondue au niveau national ont répondu “Oui” soit 1 598 apiculteurs.

En région Normandie, 3,38 % des apiculteurs répondants toute taille d’exploitation confondue ont répondu “Oui” à la question “Avez-vous transhumé vos colonies au moins une fois pour produire du miel ou pour la pollinisation ?” soit 29 apiculteurs.

#### b) Caractéristiques des apiculteurs inclus en fonction de la taille de cheptel hiverné

L’objectif ici est d’avoir une idée des caractéristiques des apiculteurs inclus en fonction de la taille de cheptel hiverné afin de mieux connaître cette population d’apiculteurs pour lesquels on aura des données de mortalité et de pertes.

Le tableau suivant résume les caractéristiques des répondants inclus par catégorie de taille de cheptel hiverné au niveau régional et national.

*Tableau 7: Caractéristiques des apiculteurs répondants inclus au niveau régional et national en fonction de la catégorie de la taille du cheptel hiverné lors de l’enquête ENMHA 2023-2024. La catégorie des >=50 a été divisée en deux sous-catégories qui sont présentées en gris. En ce qui concerne les adhérents, cela prend en compte les adhésions à une organisation dispensant des conseils en apiculture.*

	Catégorie de taille de cheptel déclaré										Toutes catégories confondues	
	[1-10]		[11-49]		>=50		[50-199]		>=200			
Caractéristiques	régional	national	régional	national	régional	national	régional	national	régional	national	régional	national
Nb d'adhérents	369	7 253	92	1 915	15	417	10	262	5	155	476	9 585
%	54,5 %	55,7 %	60,9 %	63,5 %	51,7 %	54,5 %	50 %	54,7 %	55,6 %	54,2 %	55,5 %	57 %
Nb de non-adhérents	171	3 030	16	304	3	70	1	44	2	26	190	3 404
%	25,3 %	23,3 %	10,6 %	10,1 %	10,3 %	9,15 %	5 %	9,19 %	22,2 %	9,09 %	22,2 %	20,3 %
Nb de non-répondants	137	2 745	43	797	11	278	9	173	2	105	191	3 820
%	20,2 %	21,1 %	28,5 %	26,4 %	37,9 %	36,3 %	45 %	36,1 %	22,2 %	36,7 %	22,3 %	22,7 %
Ancienneté												
Nb de 0 à 1 an	93	1 675	5	45	0	16	0	15	0	1	98	1 736
%	13,7 %	12,9 %	3,31 %	1,49 %	0 %	2,09 %	0 %	3,13 %	0 %	0,35 %	11,4 %	10,3 %
Nb de 2 à 5 ans	273	4 700	32	589	3	88	2	75	1	13	308	5 377

	Catégorie de taille de cheptel déclaré										Toutes catégories confondues	
	[1-10]		[11-49]		>=50		[50-199]		>=200			
Caractéristiques	régional	national	régional	national	régional	national	régional	national	régional	national	régional	national
%	40,3 %	36,1 %	21,2 %	19,5 %	10,3 %	11,5 %	10 %	15,7 %	11,1 %	4,55 %	35,9 %	32 %
Nb de 6 - 10 ans	78	1 576	27	484	1	94	1	56	0	38	106	2 154
%	11,5 %	12,1 %	17,9 %	16 %	3,45 %	12,3 %	5 %	11,7 %	0 %	13,3 %	12,4 %	12,8 %
Nb de > 10 ans	109	2 608	45	1 137	14	298	8	167	6	131	168	4 043
%	16,1 %	20 %	29,8 %	37,7 %	48,3 %	39 %	40 %	34,9 %	66,7 %	45,8 %	19,6 %	24,1 %
Nb de non répondants	124	2 469	42	761	11	269	9	166	2	103	177	3 499
%	18,3 %	19 %	27,8 %	25,2 %	37,9 %	35,2 %	45 %	34,7 %	22,2 %	36 %	20,7 %	20,8 %
Nb apiculteurs bio	2	27	0	21	4	97	2	45	2	52	6	145
%	0,295 %	0,207 %	0 %	0,696 %	13,8 %	12,7 %	10 %	9,39 %	22,2 %	18,2 %	0,7 %	0,863 %
Nb apiculteurs non bio	550	10 531	109	2 234	14	399	9	268	5	131	673	13 164
%	81,2 %	80,8 %	72,2 %	74,1 %	48,3 %	52,2 %	45 %	55,9 %	55,6 %	45,8 %	78,5 %	78,3 %
Nb non-répondants	125	2 470	42	761	11	269	9	166	2	103	178	3 500
%	18,5 %	19 %	27,8 %	25,2 %	37,9 %	35,2 %	45 %	34,7 %	22,2 %	36 %	20,8 %	20,8 %
Nb apiculteurs transhumants	17	790	9	518	3	290	1	145	2	145	29	1 598
%	2,51 %	6,06 %	5,96 %	17,2 %	10,3 %	37,9 %	5 %	30,3 %	22,2 %	50,7 %	3,38 %	9,51 %
Nb apiculteurs non-	534	9 762	100	1 737	15	206	10	168	5	38	649	11 705



	Catégorie de taille de cheptel déclaré										Toutes catégories confondues	
	[1-10]		[11-49]		>=50		[50-199]		>=200			
Caractéristiques	régional	national	régional	national	régional	national	régional	national	régional	national	régional	national
transhumants												
%	78,9 %	74,9 %	66,2 %	57,6 %	51,7 %	26,9 %	50 %	35,1 %	55,6 %	13,3 %	75,7 %	69,6 %
Nb apiculteurs non-répondants	126	2 476	42	761	11	269	9	166	2	103	179	3 506
%	18,6 %	19 %	27,8 %	25,2 %	37,9 %	35,2 %	45 %	34,7 %	22,2 %	36 %	20,9 %	20,9 %
<b>TOTAL EFFECTIF</b>	<b>677</b>	<b>13 028</b>	<b>151</b>	<b>3 016</b>	<b>29</b>	<b>765</b>	<b>20</b>	<b>479</b>	<b>9</b>	<b>286</b>	<b>857</b>	<b>16 809</b>

#### (1) Adhésion à une organisation dispensant des conseils en apiculture

Au niveau national, 67,2 % des apiculteurs répondants inclus toute taille d'exploitation confondue ont répondu être adhérent à une organisation dispensant des conseils en apiculture soit 9 565 apiculteurs.

En région Normandie, 64,7 % des apiculteurs répondants inclus toute taille d'exploitation confondue ont répondu être adhérent à une organisation dispensant des conseils en apiculture soit 475 apiculteurs.

#### (2) Années d'ancienneté des apiculteurs

En ce qui concerne les années d'ancienneté en apiculture des répondants inclus toute taille d'exploitation confondue, la distribution des valeurs a les caractéristiques suivantes :

Au niveau national, la médiane des années d'ancienneté est de 5 ans, ainsi la moitié des répondants ont moins de 5 ans d'ancienneté. Les premier et troisième quartiles sont respectivement de 3 ans et 10 ans.

Au niveau régional, les apiculteurs répondants inclus ont 5 ans d'ancienneté. Les premier et troisième quartiles sont respectivement de 3 ans et de 10 ans.

La figure suivante permet de visualiser la distribution des valeurs d'ancienneté en apiculture des apiculteurs inclus au niveau régional et national en fonction de la catégorie de taille de cheptel hiverné.




Figure 17: Diagrammes en violon qui sont une combinaison entre un diagramme en boîte, Box Plot, et un diagramme d'estimation de densité qui affiche les pics de données. Ainsi sont représentées les valeurs médianes, minimales, maximales des années d'ancienneté en apiculture. La figure de gauche reprend les diagrammes par catégories de taille de cheptel déclaré des apiculteurs répondants dans l'enquête ENMHA au niveau régional et à droite au niveau national. Les valeurs des médianes sont précisées en rouge.

### (3) Apiculture biologique

Au niveau national, 1,01 % des apiculteurs répondants inclus toute taille d'exploitation confondue ont répondu être en "apiculture biologique" soit 144 apiculteurs.

En région Normandie, 0,7 % des apiculteurs répondants inclus toute taille d'exploitation confondue ont répondu être en "apiculture biologique" soit 6 apiculteurs.

### (4) Transhumance

Au niveau national, 11,2 % des apiculteurs répondants inclus toute taille d'exploitation confondue ont répondu "Oui" à la question "Avez-vous transhumé vos colonies au moins une fois pour produire du miel ou pour la pollinisation ?" soit 1 595 apiculteurs .

En région Normandie, 3,95 % des apiculteurs répondants inclus toute taille d'exploitation confondue ont répondu "Oui" à la question "Avez-vous transhumé vos colonies au moins une fois pour produire du miel ou pour la pollinisation ?" soit 29 apiculteurs .

## C. Caractéristiques de l'hivernage

### 1. Durée de l'hivernage

La Figure 10 reprend les mois de **mise en hivernage** indiqués par les apiculteurs inclus au niveau national et régional au cours de l'enquête ENMHA.

La Figure 18 reprend les mois de **sortie d'hivernage** indiqués par les apiculteurs inclus au niveau national et régional au cours de l'enquête ENMHA.




Figure 18: Nombre d'apiculteurs inclus en fonction du mois de sortie d'hivernage déclaré dans l'enquête ENMHA 2023-2024 au niveau national (en haut) et régional (en bas). Les pourcentages

sont précisés pour chaque mois en fonction de l'ensemble des apiculteurs inclus. NA : Valeur non attribuée dans le questionnaire.

La Figure 19 reprend les durées d'hivernage calculées à partir des mois de mise en hivernage et des mois de sortie d'hivernage par les apiculteurs inclus respectivement au niveau national et régional au cours de l'enquête ENMHA.




Figure 19: Nombre d'apiculteurs inclus en fonction de la durée d'hivernage en nombre de mois déclarée dans l'enquête ENMHA 2023-2024 au niveau national (en haut) et régional (en bas). Les

pourcentages sont précisés pour chaque mois en fonction de l'ensemble des apiculteurs inclus. NA : Valeur non attribuée dans le questionnaire soit pour l'entrée en hivernage soit pour la sortie d'hivernage empêchant le calcul d'une durée d'hivernage.

## **2. Emplacement de l'hivernage**

### *a) Nombre d'emplacements d'hivernage*

Les réponses concernant le nombre de ruchers d'hivernage (sites d'emplacement) sont présentées en fonction de la catégorie de cheptel hiverné des apiculteurs au niveau national et régional. Ainsi, pour des raisons de lisibilité les principaux résultats sont présentés :

- dans la Figure 20, pour la catégorie [1-10] CEN hivernés,
- dans la Figure 21 pour la catégorie [11-49] CEN hivernés,
- dans la Figure 22 pour la catégorie  $\geq 50$  CEN hivernés.




Figure 20: Nombre d'emplacements d'hivernage déclarés par apiculteur dans l'enquête ENMHA 2023-2024 par les apiculteurs inclus de la catégorie de cheptel hiverné [1-10] au niveau national (en haut) et au niveau régional (en bas). Les pourcentages sont précisés pour chaque nombre d'emplacements. Le nombre d'emplacements a été limité à 10.





Figure 21: Nombre d'emplacements d'hivernage déclarés par apiculteur dans l'enquête ENMHA 2023-2024 par les apiculteurs inclus de la catégorie de cheptel hiverné [11-49] au niveau national (en haut) et au niveau régional (en bas). Les pourcentages sont précisés pour chaque nombre d'emplacements. Le nombre d'emplacements a été limité à 49.




Figure 22: Nombre d'emplacements d'hivernage déclarés par apiculteur dans l'enquête ENMHA 2023-2024 par les apiculteurs inclus de la catégorie de cheptel hiverné  $\geq 50$  au niveau national (en haut) et au niveau régional (en bas). Les pourcentages sont précisés pour chaque nombre d'emplacements. Le nombre d'emplacements a été limité à 100.

### b) Distance relative des différents emplacements

Dans le questionnaire, une question adressée aux apiculteurs ayant déclaré plusieurs emplacements (3 833 apiculteurs concernés au niveau national et 200 apiculteurs au niveau régional) leur



demandait si ces emplacements étaient à moins de 15 kms les uns des autres. Les réponses obtenues sont présentées dans la Figure 23 au niveau national et en Normandie.




Figure 23: Réponses des apiculteurs inclus ayant plus de deux emplacements de ruches afin de savoir si tous les emplacements sont à moins de 15 kms les uns des autres au niveau national (figure du haut) et au niveau régional (figure du bas). Les pourcentages sont précisés pour chaque réponse.

### 3. Caractéristiques des CEN hivernés

#### a) Composition des CEN hivernés

Le cheptel national était composé à l'entrée en hivernage de 71,6 % de colonies de production, 26,6% d'essaims et de 1,83% de nucléi.

Le cheptel régional était composé à l'entrée en hivernage de 61,1 % de colonies de production, 37,3% d'essaims et de 1,61% de nucléi.

### b) Etat des CEN à la mise en hivernage

#### Au niveau national :

A la question sur le nombre de CEN pour lesquels l'apiculteur présentait que leur état ne permettrait pas de passer l'hiver (ressentis faibles), 4 396 apiculteurs ont indiqué un nombre de CEN soit 30,86% des apiculteurs inclus. Au total ce sont 14 046 CEN qui étaient concernées soit 5,55 % des 253 050 CEN des apiculteurs inclus.

Par apiculteur, la médiane de l'ensemble des pourcentages par apiculteur de CEN concernés (ressentis faibles), par rapport au nombre total de CEN hivernés est de 20 % .

#### Au niveau régional :

A la question sur le nombre de CEN pour lesquels l'apiculteur présentait que leur état ne permettrait pas de passer l'hiver (ressentis faibles), 254 apiculteurs ont indiqué un nombre de CEN soit 34,6% des apiculteurs inclus. Au total ce sont 685 CEN qui étaient concernées soit 5,5% des 12 451 CEN des apiculteurs inclus.

Par apiculteur, la médiane de l'ensemble des pourcentages par apiculteur de CEN concernés (pas en bon état), par rapport au nombre total de CEN déclarés est de 20 %.




Figure 26: Diagrammes en violon qui sont une combinaison entre un diagramme en boîte, Box Plot, et un diagramme d'estimation de densité qui affiche les pics de données, permettant de représenter le pourcentage de CEN ressentis faibles par apiculteur au niveau national et au niveau régional.

### c) Type de reines

Seuls les apiculteurs ayant répondu aux questions suivantes ont été considérés:

- “Combien de colonies mises en hivernage en 2023 disposaient d’une reine de l’année ?”
- “Combien de colonies mises en hivernage en 2023 disposaient d’une reine de plus d’un an ?”

La somme des reines de l'année et des reines de plus d'un an n'étant pas forcément égale au nombre de colonies déclarées, il se peut que la somme des pourcentages finaux ne soit pas égale à 100.

**Au niveau national:**

Le nombre total de CEN avec des reines de l'année était de 108 340 CEN ce qui correspond à 51 % des CEN des apiculteurs qui ont donné l'information au niveau national.

Le nombre total de CEN avec des reines de plus d'un an était de 85 932 CEN ce qui correspond à 41 % des CEN des apiculteurs qui ont donné l'information au niveau national.

**Dans la région Normandie:**

Le nombre total de CEN avec des reines de l'année était de 4 242 CEN ce qui correspond à 38,9 % des CEN des apiculteurs qui ont donné l'information.

Le nombre total de CEN avec des reines de plus d'un an était de 3 992 CEN ce qui correspond à Inf % des CEN des apiculteurs qui ont donné l'information.

## D. Descriptif de la mortalité hivernale et des pertes hivernales

### **ATTENTION**

*Les indicateurs présentés ci-dessous ont uniquement une valeur descriptive et non explicative. Il n'est pas possible de déduire un lien de causalité entre un facteur et la mortalité. Cela nécessiterait des analyses statistiques complémentaires multivariées d'une part pour objectiver une différence statistiquement significative prenant en compte des facteurs de confusion et la mise en œuvre par la suite d'une étude dédiée pour confirmer un lien avéré de causalité d'autre part.*

### 1. Pourcentage de mortalité

#### a) Tout apiculteur confondu

##### (1) Sur l'ensemble des CEN

A partir des données issues de la population incluse, le pourcentage estimé de mortalité hivernale du cheptel au niveau national (= nombre total de CEN mort/ nombre de CEN hiverné \*100) est de 18,4 % IC95 [18,3-18,6].

A partir des données de la population incluse au niveau régional le pourcentage de mortalité brute hivernale estimée du cheptel régional (il s'agit de la région de résidence de l'apiculteur) est de 20,4 % IC95 [19,7-21,1].

Le pourcentage de mortalité hivernale du cheptel sur l'ensemble des autres régions est estimé à 18,3 % IC95 [18,2-18,5]. Il y a une différence significative (test du khi 2 avec une valeur de  $p < 0,05$ ) entre la mortalité observée dans les autres régions et celle observée en Normandie.

En ce qui concerne la mortalité déclarée par les apiculteurs des départements de la région Normandie, les résultats sont présentés dans la figure suivante.




Figure 27: Valeurs des taux de mortalités pour les départements de la région, en violet les bornes de l'intervalle de confiance. Les lignes rouge et verte correspondent aux taux de mortalité au niveau national et régional respectivement, les lignes pointillées représentent les valeurs des intervalles de confiance.

### (2) Mortalité au niveau de l'ensemble des CEN des apiculteurs inclus par catégorie de cheptel mis à l'hivernage

On s'intéresse maintenant à la mortalité du cheptel par catégorie de taille de cheptel mis à l'hivernage.

Tableau 8: Cheptel mort pendant l'hivernage (exprimé en nombre de colonies de production/ essaim/ nucléi), cheptel total à la mise en hivernage et pourcentage de mortalité au niveau régional et national en fonction de la catégorie de la taille du cheptel hiverné lors de l'enquête ENMHA 2023-2024. La catégorie des  $\geq 50$  a été divisée en deux sous-catégories qui sont présentées en grisé.

Catégorie de taille de cheptel hiverné	Cheptel mort (CEN)		Cheptel total (CEN)		% de mortalité	
	régional	national	régional	national	régional	national
[1-10]	620	8 905	3 476	46 708	17,8	19,1
[11-49]	434	12 150	2 635	67 758	16,5	17,9
[50-199]	295	8 149	1 642	42 868	18	19
$\geq 200$	1 188	17 420	4 698	95 716	25,3	18,2
$\geq 50$	1 483	25 569	6 340	138 584	23,4	18,5

### (3) Par type de CEN

Dans cette partie, il s'agit de décrire la mortalité sur l'ensemble de chacun des types de CEN au niveau national.

Au niveau national :

La mortalité hivernale observée plus particulièrement chez les colonies de production des apiculteurs inclus était de 17,84 % (32 330 colonies de productions déclarées mortes après l'hivernage parmi les 181 187 colonies de production déclarées mises en hivernage).

La mortalité hivernale observée plus particulièrement chez les essaims des apiculteurs inclus était de 19,43 % (13 061 essaims déclarés morts après l'hivernage parmi les 67 238 essaims déclarés mis en hivernage).

La mortalité hivernale observée plus particulièrement chez les nuclei des apiculteurs inclus était de 26,66 % (1 233 nuclei déclarés morts après l'hivernage parmi les 4 625 nuclei déclarées mis en hivernage).

Au niveau régional

Au niveau régional, la mortalité hivernale observée plus particulièrement chez les colonies de production des apiculteurs inclus était de 17,84 % (1 447 colonies de productions déclarées mortes après l'hivernage parmi les 7 604 colonies de production déclarées mises en hivernage).

Au niveau régional, la mortalité hivernale observée plus particulièrement chez les essaims des apiculteurs inclus était de 19,43 % (1 037 essaims déclarés morts après l'hivernage parmi les 4 647 essaims déclarés mis en hivernage).

Au niveau régional, la mortalité hivernale observée plus particulièrement chez les nuclei des apiculteurs inclus était de 26,66 % (53 nuclei déclarés morts après l'hivernage parmi les 200 nuclei déclarées mis en hivernage).

#### b) Par apiculteur

Le tableau suivant ainsi que la Figure 28 permettent de décrire le pourcentage de mortalité par apiculteur.

*Tableau 9: Médianes, valeurs minimales et maximales du pourcentage de mortalité hivernale par apiculteur au niveau régional et national en fonction de la catégorie de la taille du cheptel hiverné lors de l'enquête ENMHLA 2023-2024. La catégorie des  $\geq 50$  a été divisée en deux sous-catégories qui sont présentées en grisé.*

Catégorie de taille de cheptel hiverné	% de mortalité par apiculteur Médiane [min;max]	
	régional	national
[1-10]	0 [0 - 100]	0 [0 - 100]
[11-49]	12,9 [0 - 76,5]	13 [0 - 100]
[50-199]	20,5 [0 - 50]	13,7 [0 - 90,4]
$\geq 200$	21,2 [7,5 - 56]	13,1 [0 - 90]
$\geq 50$	21,2 [0 - 56]	13,4 [0 - 90,4]
Total	2,8 [0 - 100]	5,71 [0 - 100]




Figure 28: Diagrammes en violon qui sont une combinaison entre un diagramme en boîte, Box Plot, et un diagramme d'estimation de densité qui affiche les pics de données, permettant de représenter les mortalités par apiculteur en fonction de la catégorie de taille de cheptel hiverné au niveau national (en haut) et au niveau régional (en bas).

## 2. Pourcentage de pertes (CEN considérées comme morts, faibles, bourdonneux ou accidentés)

### a) Tout apiculteur confondu

#### (1) Pour tous les CEN

Au sein de la population incluse, le pourcentage de pertes du cheptel national pendant l'hivernage est de 30,7 % IC95 [30,6-30,9].

Le pourcentage de pertes du cheptel régional (il s'agit de la région de résidence de l'apiculteur) pendant l'hivernage est de 31,7 % IC95 [30,8-32,5].

Le pourcentage de pertes brute hivernale du cheptel sur l'ensemble des autres régions est de 30,7 % IC95 [30,5-30,9]. Il y a une différence significative (test du Khi2 avec une valeur de  $p < 0,05$ ) entre les pertes observées dans les autres régions et celles observées en Normandie.

En ce qui concerne les pertes observées dans les départements de résidence des apiculteurs de la région Normandie, les résultats sont présentés dans la figure suivante.




Figure 29: Valeurs des pourcentages de pertes pour les départements de la région, en violet les bornes de l'intervalle de confiance. Les lignes rouge et verte correspondent aux pourcentages de pertes au niveau national et régional respectivement, les lignes pointillées représentent les valeurs des intervalles de confiance.

### (2) Par catégorie de taille de cheptel mis à l'hivernage.

Tableau 10: Pertes pendant l'hivernage (exprimées en nombre de colonie de production/ essaim/ nucléi), cheptel total à la mise en hivernage et pourcentage de pertes au niveau régional et national en fonction de la catégorie de la taille du cheptel hiverné lors de l'enquête ENMHA 2023-2024. La catégorie des  $\geq 50$  a été divisée en deux sous-catégories qui sont présentées en grisé.

Catégorie de taille de cheptel hiverné	Nombre de CEN perdus		Nombre total de CEN		% de pertes [IC95]	
	régional	national	régional	national	régional	national
[1-10]	1 128	14 355	3 476	46 708	32,5	30,7
[11-49]	857	21 059	2 635	67 758	32,5	31,1
[50-199]	535	13 270	1 642	42 868	32,6	31
$\geq 200$	1 422	29 081	4 698	95 716	30,3	30,4
$\geq 50$	1 957	42 351	6 340	138 584	32	30,6

Au niveau national, il n'y a pas de différence significative (test du khi 2 avec une valeur de  $p \geq 0,05$ ) entre les pourcentages de pertes des CEN des apiculteurs des différentes catégories de taille de cheptel hiverné.

Pour la région Normandie, il n'y a pas de différence significative (test du khi 2 avec une valeur de  $p \geq 0,05$ ) entre les pourcentages de pertes des CEN des apiculteurs des différentes catégories de taille de cheptel hiverné.

### (3) Par type de CEN

Dans cette partie, il s'agit de décrire les pertes sur l'ensemble de chacun des types de CEN au niveau national.

Au niveau national, les pertes hivernales observées plus particulièrement chez les colonies de production des apiculteurs inclus étaient de 29,91 % (32 330 colonies de productions déclarées perdues après l'hivernage parmi les 181 187 colonies de production déclarées mises en hivernage). Les pertes hivernales observées plus particulièrement chez les essais des apiculteurs inclus étaient de 33 % (13 061 essais déclarés perdus après l'hivernage parmi les 67 238 essais déclarés mis en hivernage).

Les pertes hivernales observées plus particulièrement chez les nucléis des apiculteurs inclus étaient de 30,05 % (1 233 nucléis déclarés perdus après l'hivernage parmi les 4 625 nucléis déclarées mis en hivernage).

Au niveau régional, les pertes hivernales observées plus particulièrement chez les colonies de production des apiculteurs inclus étaient de 29,91 % (1 447 colonies de productions déclarées perdues après l'hivernage parmi les 7 604 colonies de production déclarées mises en hivernage).

Au niveau régional, les pertes hivernales observées plus particulièrement chez les essais des apiculteurs inclus étaient de 33 % (1 037 essais déclarés perdus après l'hivernage parmi les 4 647 essais déclarés mis en hivernage).

Au niveau régional, les pertes hivernales observées plus particulièrement chez les nucléis des apiculteurs inclus étaient de 30,05 % (53 nucléis déclarés perdus après l'hivernage parmi les 200 nucléis déclarées mis en hivernage).



b) Par type de pertes (autre que la mortalité présentée auparavant)

(1) Au niveau national

Tableau 11: Nombres et pourcentages des CEN perdus (morts, faibles, bourdonneux, accidentés) à la sortie d'hivernage, nombre de CEN hivernés et pourcentage de mortalité des CEN par région lors de l'enquête ENMHA 2023-2024.

Etat des CEN perdus après hivernage	Nombre	% par rapport aux CEN hivernés	% par rapport aux pertes totales
Morts	46 624	18,42	59,95
Faibles	22 475	8,88	28,9
Bourdonneux	6 046	2,39	7,77
Accidents	2 620	1,04	3,37
<b>Total des pertes</b>	<b>77 765</b>	<b>30,73</b>	<b>100</b>

(2) Au niveau régional

Le tableau ci-dessous reprend les résultats concernant les CEN faibles sur l'ensemble des CEN mis en hivernage des apiculteurs inclus par département de la région Normandie.

Tableau 12: Nombres de CEN faibles à la sortie d'hivernage, nombre de CEN hivernés et pourcentage de CEN faibles par département de la région lors de l'enquête ENMHA 2023-2024.

	Nbre de CEN faibles	Nbre de CEN hivernés	% de faibles
76	322	4 702	6,85
14	190	2 287	8,31
27	233	2 544	9,16
50	187	1 954	9,57
61	95	964	9,85
<b>Total</b>	<b>22 475</b>	<b>253 050</b>	<b>8,88</b>

Le tableau ci-dessous reprend les résultats concernant les CEN bourdonneux sur l'ensemble des CEN mis en hivernage des apiculteurs inclus par département de la région Normandie.

Tableau 13: Nombres de CEN bourdonneux à la sortie d'hivernage, nombre de CEN hivernés et pourcentage de CEN bourdonneux par département de la région lors de l'enquête ENMHA 2023-2024.

	Nbre de CEN bourdonneux	Nbre de CEN hivernés	% de bourdonneux
27	46	2 544	1,81
76	88	4 702	1,87
14	46	2 287	2,01
61	22	964	2,28
50	61	1 954	3,12
<b>Total</b>	<b>6 046</b>	<b>253 050</b>	<b>2,39</b>

Le tableau ci-dessous reprend les résultats concernant les CEN accidentés sur l'ensemble des CEN mis en hivernage des apiculteurs inclus par département de la région Normandie.

*Tableau 14: Nombres de CEN accidentés à la sortie d'hivernage, nombre de CEN hivernés et pourcentage d'accidents par département de la région lors de l'enquête ENMHA 2023-2024.*

	Nbre de CEN accidentés	Nbre de CEN hivernés	% de accidents
61	3	964	0,31
76	19	4 702	0,4
14	24	2 287	1,05
27	30	2 544	1,18
50	39	1 954	2
Total	2 620	253 050	1,04

*c) En fonction de l'adhésion à une organisation dispensant des conseils en apiculture:*

*Tableau 15: Pertes pendant l'hivernage (exprimées en nombre de colonie de production/ essaim/ nucléi), cheptel total à la mise en hivernage et pourcentage de pertes au niveau régional et national en fonction de l'adhésion à une organisation dispensant des conseils en apiculture, lors de l'enquête ENMHA 2023-2024.*

Adhésion	Nombre de CEN perdus		Nombre de CEN total		% de pertes	
	régional	national	régional	national	régional	national
Absence de réponse	397	7 252	1 085	25 400	36,6	28,6
non	807	11 682	2 430	35 311	33,2	33,1
oui	2 738	58 831	8 936	192 339	30,6	30,6

Au niveau national, il y a une différence significative (test du khi 2 avec une valeur de  $p < 0,05$ ) entre les pourcentages de pertes des CEN des apiculteurs qui adhèrent à une organisation dispensant des conseils en apiculture par rapport à ceux qui n'adhèrent pas ou qui n'ont pas répondu.

Pour la région Normandie, il y a une différence significative (test du khi 2 avec une valeur de  $p < 0,05$ ) entre les pourcentages de pertes des CEN des apiculteurs qui adhèrent à une organisation dispensant des conseils en apiculture par rapport à ceux qui n'adhèrent pas ou qui n'ont pas répondu.

d) *En fonction de l'ancienneté en apiculture:*

Tableau 16: Pertes pendant l'hivernage (exprimées en nombre de colonie de production/ essaim/ nucléi), cheptel total à la mise en hivernage et pourcentage de pertes au niveau régional et national en fonction l'ancienneté en apiculture, lors de l'enquête ENMHA 2023-2024.

Ancienneté	Nombre de CEN perdus		Nombre de CEN total		% de pertes [IC]	
	régional	national	régional	national	régional	national
[0-1]	2 208	40 115	6 703	129 142	32,9	31,1
[2-5]	124	2 266	391	7 859	31,7	28,8
[6-10]	862	15 591	3 135	51 368	27,5	30,4
>=10	365	13 573	1 194	42 752	30,6	31,7
NR	383	6 220	1 028	21 929	37,3	28,4

Au niveau national, il y a une différence significative (test du khi 2 avec une valeur de  $p < 0,05$ ) entre les pourcentages de pertes des CEN des apiculteurs des différentes catégories d'ancienneté en apiculture déclarées.

Pour la région Normandie, il y a une différence significative (test du khi 2 avec une valeur de  $p < 0,05$ ) entre les pourcentages de pertes des CEN des apiculteurs des différentes catégories d'ancienneté en apiculture déclarées.

e) *En fonction du critère d'apiculture biologique*

Il s'agit de la déclaration selon l'apiculteur avec les doutes que l'on peut avoir concernant la bonne compréhension de cette question explicitée précédemment :

Tableau 17: Pertes pendant l'hivernage (exprimées en nombre de colonie de production/ essaim/ nucléi), cheptel total à la mise en hivernage et pourcentage de pertes ainsi que son intervalle de confiance à 95% au niveau régional et national en fonction du critère apiculture biologique, lors de l'enquête ENMHA 2023-2024.

Apiculture biologique	Nombre de CEN perdus		Nombre de CEN total		% de pertes [IC95]	
	régional	national	régional	national	régional	national
Absence de réponse	385	6 222	1 031	21 934	37,3	28,4
Non	3 182	61 591	10 456	202 598	30,4	30,4
Oui	375	9 952	964	28 518	38,9	34,9

Au niveau national, il y a une différence significative (test du khi 2 avec une valeur de  $p < 0,05$ ) entre les pourcentages de pertes des CEN des apiculteurs ayant déclaré être en apiculture biologique par rapport à ceux qui ne le sont pas ou qui n'ont pas répondu..

Pour la région Normandie, il y a une différence significative (test du khi 2 avec une valeur de  $p < 0,05$ ) entre les pourcentages de pertes des CEN des apiculteurs ayant déclaré être en apiculture biologique par rapport à ceux qui ne le sont pas ou qui n'ont pas répondu.

f) *En fonction de la composition des CEN*

Le tableau suivant reprend les informations concernant les pertes observées dans les colonies de production, les essaims et les nucléi.

Tableau 18: Pertes pendant l'hivernage des colonies de production, essais et nucléi ainsi que le nombre total de colonies de production, essais et nucléi à la mise en hivernage et le pourcentage de pertes ainsi que l'intervalle de confiance à 95% au niveau régional et national, lors de l'enquête ENMHA 2023-2024.

	Nombre de pertes		Nombre total		% de pertes [IC]	
	régional	national	régional	national	régional	national
Colonies de production	2 379	54 189	7 604	181 187	31,3	29,9
Essais	1 510	22 186	4 647	67 238	32,5	33
Nucléi	53	1 390	200	4 625	26,5	30,1

Au niveau national, il y a une différence significative (test du khi 2 avec une valeur de  $p < 0,05$ ) entre les pourcentages de pertes des colonies de production, des essais et des nucléi.

Il n'y a pas de différence significative (test du khi 2 avec une valeur de  $p \geq 0,05$ ) entre les pourcentages de pertes des colonies de production, des essais et des nucléi en Normandie.

#### g) En fonction de la durée d'hivernage

Tableau 19: Pertes pendant l'hivernage (exprimées en nombre de colonie de production/ essaim/ nucléi), cheptel total à la mise en hivernage et pourcentage de pertes au niveau régional et national en fonction de la durée d'hivernage lors de l'enquête ENMHA 2023-2024.

Durée d'hivernage	Cheptel perdu (CEN)		Cheptel total (CEN)		% de pertes	
	régional	national	régional	national	régional	national
<= 3 mois	161	7 627	522	23 327	30,8	32,7
= 4 mois	1 005	19 201	2 635	59 835	38,1	32,1
= 5 mois	1 566	26 339	5 334	82 832	29,4	31,8
>= 6 mois	798	17 402	2 853	61 422	28	28,3
Absence de réponse	412	7 196	1 107	25 634	37,2	28,1

Au niveau national, il y a une différence significative (test du khi 2 avec une valeur de  $p < 0,05$ ) entre les pourcentages de pertes des CEN des apiculteurs des différentes durées d'hivernage.

Pour la région Normandie, il y a une différence significative (test du khi 2 avec une valeur de  $p < 0,05$ ) entre les pourcentages de pertes des CEN des apiculteurs des différentes durées d'hivernage.

#### h) Par apiculteur

Maintenant nous allons étudier le pourcentage de pertes par apiculteur:

Au niveau national, le pourcentage médian des pertes observées par chaque apiculteur est de 5,71 %, la moyenne est de 19,1 %.

Au niveau de la région Normandie, le pourcentage médian des pertes observées par chaque apiculteur est de 2,8 %, la moyenne est de 18,7 %.

Les pertes en fonction des catégories de taille de cheptel hiverné sont présentées par le tableau et la figure suivante.

Tableau 20: Médianes, valeurs minimales et maximales du pourcentage de mortalité hivernale par apiculteur au niveau régional et national en fonction de la catégorie de la taille du cheptel hiverné lors de l'enquête ENMHA 2023-2024. La catégorie des  $\geq 50$  a été divisée en deux sous-catégories qui sont présentées en grisé.

Catégorie de taille de cheptel hiverné	% de pertes par apiculteur Médiane [min;max]	
	régional	national
[1-10]	0 [0 - 100]	0 [0 - 100]
[11-49]	12,5 [0 - 76,5]	13 [0 - 100]
[50-199]	19,1 [0 - 50]	13,7 [0 - 90,4]
$\geq 200$	21,2 [5,56 - 56]	13,1 [0 - 90]
$\geq 50$	21,2 [0 - 56]	13,4 [0 - 90,4]
Total	2,8 [0 - 100]	5,71 [0 - 100]




Figure 28: Diagrammes en violon qui sont une combinaison entre un diagramme en boîte, Box Plot, et un diagramme d'estimation de densité qui affiche les pics de données, permettant de représenter les mortalités par apiculteur en fonction de la catégorie de taille de cheptel hiverné au niveau national (en haut) et au niveau régional (en bas).

Le pourcentage de pertes par apiculteur en fonction de l'adhésion à un organisme apicole:

Tableau 21: Médianes, valeurs minimales et maximales du pourcentage de mortalité hivernale par apiculteur au niveau régional et national en fonction de l'adhésion à un organisme apicole lors de l'enquête ENMHA 2023-2024.

	% de pertes par apiculteur Médiane [min;max]	
	régional	national
<b>Adhésion</b>		
Absence de réponse	0 [0 - 100]	7,69 [0 - 100]
non	0 [0 - 100]	0 [0 - 100]
oui	7,5 [0 - 100]	7,14 [0 - 100]
<b>Total</b>	<b>2,8 [0 - 100]</b>	<b>5,71 [0 - 100]</b>

Le pourcentage de pertes par apiculteur en fonction de l'ancienneté en apiculture:

Tableau 22: Médianes, valeurs minimales et maximales du pourcentage de mortalité hivernale par apiculteur au niveau régional et national en fonction de l'ancienneté en apiculture lors de l'enquête ENMHA 2023-2024.

	% de pertes par apiculteur Médiane [min;max]	
	régional	national
<b>Ancienneté</b>		
[0-1]	0 [0 - 100]	0 [0 - 100]
[2-5]	0 [0 - 100]	0 [0 - 100]
[6-10]	9,52 [0 - 100]	10 [0 - 100]
>=10	10 [0 - 100]	11,8 [0 - 100]
Absence de réponse	0 [0 - 100]	8,33 [0 - 100]
<b>Total</b>	<b>2,8 [0 - 100]</b>	<b>5,71 [0 - 100]</b>

Enfin, le pourcentage de pertes par apiculteur en fonction du critère d'apiculture biologique:

Tableau 23: Médianes, valeurs minimales et maximales du pourcentage de mortalité hivernale par apiculteur au niveau régional et national en fonction du critère d'apiculture biologique lors de l'enquête ENMHA 2023-2024.

	% de pertes par apiculteur Médiane [min;max]	
	régional	national
<b>Apiculture biologique</b>		
Absence de réponse	1,28 [0 - 100]	5,26 [0 - 100]
Non	43,5 [0 - 100]	14,4 [0 - 100]
Oui	0 [0 - 100]	8,33 [0 - 100]
<b>Total</b>	<b>2,8 [0 - 100]</b>	<b>5,71 [0 - 100]</b>

### 3. Ressenti et analyse des apiculteurs concernant les pertes

#### a) Anormalité des pertes de l'hiver 2022-2023

A la question “Concernant l’hiver 2023-2024, avez-vous observé des pertes anormalement élevées en particulier sur un ou des ruchers de votre exploitation ?”, 17,3 % des apiculteurs inclus au niveau national ont répondu “oui” et 16,5 % des apiculteurs inclus au niveau régional.




Figure 30: Figure du haut, nombre d’apiculteurs en fonction des réponses apportées à la question sur l’observation des pertes anormalement élevées en particulier sur un ou des ruchers de



l'exploitation des apiculteurs par département. En rouge, les apiculteurs qui ont observé des pertes anormalement élevées. La figure du bas représente quant à elle le pourcentage d'apiculteurs en fonction de la réponse apportée par département. Dans cette figure ont été ajoutés, à titre de comparaison, les pourcentages d'apiculteurs ayant observé des pertes anormalement élevées au niveau régional et au niveau national par des lignes pointillée et pleine respectivement.

Par la suite, ces résultats ont été regardé par catégorie de cheptel hiverné. Pour la catégorie de taille de cheptel hiverné [1-10] CEN :

- 14,2 % des apiculteurs inclus au niveau national ont répondu “oui” à la question sur les pertes anormalement élevée.
- 12,4 % des apiculteurs inclus au niveau régional ont répondu “oui”.




Figure 31: Figure du haut, nombre d'apiculteurs de la catégorie de cheptel hiverné [1-10] CEN en fonction des réponses apportées à la question sur l'observation des pertes anormalement élevées en particulier sur un ou des ruchers de l'exploitation des apiculteurs par département. En rouge, les apiculteurs qui ont observé des pertes anormalement élevées. La figure du bas représente quant à elle le pourcentage d'apiculteurs en fonction de la réponse apportée par département. Dans cette figure ont été ajoutés, à titre de comparaison, les pourcentages d'apiculteurs ayant observé des pertes anormalement élevées au niveau régional et au niveau national par des lignes pointillée et pleine respectivement.

Pour la catégorie de taille de cheptel hiverné [11-49] CEN:

- 22,1 % des apiculteurs inclus au niveau national ont répondu “oui”
- 22,3 % des apiculteurs inclus au niveau régional ont répondu “oui”.




Figure 32: Figure du haut, nombre d’apiculteurs de la catégorie de cheptel hiverné [11-49] CEN en fonction des réponses apportées à la question sur l’observation des pertes anormalement élevées en particulier sur un ou des ruchers de l’exploitation des apiculteurs par département. En rouge, les apiculteurs qui ont observé des pertes anormalement élevées. La figure du bas représente quant à elle le pourcentage d’apiculteurs en fonction de la réponse apportée par département. Dans cette

figure ont été ajoutés, à titre de comparaison, les pourcentages d'apiculteurs ayant observé des pertes anormalement élevées au niveau régional et au niveau national par des lignes pointillée et pleine respectivement.

Pour la catégorie de taille de cheptel hiverné [50-199] CEN:

- 37,2 % des apiculteurs inclus au niveau national ont répondu "oui".
- 64,3 % des apiculteurs inclus au niveau régional ont répondu "oui".

Pour la catégorie de taille de cheptel hiverné  $\geq 200$  CEN:

- 43,4 % des apiculteurs inclus au niveau national ont répondu "oui".
- 66,7 % des apiculteurs inclus au niveau régional ont répondu "oui".




Figure 33: Figure du haut, nombre d'apiculteurs de la catégorie de cheptel hiverné  $\geq 50$  CEN en fonction des réponses apportées à la question sur l'observation des pertes anormalement élevées en particulier sur un ou des ruchers de l'exploitation des apiculteurs par département. En rouge, les apiculteurs qui ont observé des pertes anormalement élevées. La figure du bas représente quant à elle le pourcentage d'apiculteurs en fonction de la réponse apportée par département. Dans cette figure ont été ajoutés, à titre de comparaison, les pourcentages d'apiculteurs ayant observé des pertes anormalement élevées au niveau régional et au niveau national par des lignes pointillée et pleine respectivement.

### b) Localisation des pertes anormales

Les apiculteurs avaient la possibilité de citer jusqu'à cinq départements dans lesquels ils ont estimé que les pertes étaient anormalement élevées. Certains apiculteurs ont saisi le même département plusieurs fois ainsi, ici seuls les départements différents de ceux précédemment cités par un apiculteur sont pris en compte. Ainsi, ci-dessous, sont présentés les différents cas de figures :

- le premier département cité.  
Parmi les 7 774 apiculteurs qui ont cité un département dans lequel ils ont estimé que les pertes étaient anormalement élevées, 484 apiculteurs ont cité un département différent du département de leur adresse ( 6,23%).
- Un deuxième département cité.  
Parmi les 259 apiculteurs qui ont cité un deuxième département dans lequel ils ont estimé que les pertes étaient anormalement élevées, 187 apiculteurs ont cité un département différent du département de leur adresse ( 72,2%).
- Un troisième département cité.  
Parmi les 19 apiculteurs qui ont cité un troisième département dans lequel ils ont estimé que les pertes étaient anormalement élevées, 15 apiculteurs ont cité un département différent du département de leur adresse (78,9%).
- Un quatrième département cité.  
Parmi les 4 apiculteurs qui ont cité un quatrième département dans lequel ils ont estimé que les pertes étaient anormalement élevées, 3 apiculteurs ont cité un département différent du département de leur adresse (75%).
- Un cinquième département cité.  
Aucun apiculteur n'a cité un cinquième département.

### c) Causes des pertes de l'hiver 2022-2023

Les différentes causes de pertes avancées par les apiculteurs au niveau national sont présentées dans le tableau suivant.

Tableau 24: Au niveau national, nombre de citations des différentes causes ayant provoqué des pertes hivernales selon les apiculteurs et pourcentage de chaque cause en fonction du nombre total des causes avancées.

Causes citées	Nombre de citations	% parmi les citations
Frelon asiatique	3 910	22,1
Des colonies de production/essaims/nuclei faibles au moment de la mise en hivernage	3 444	19,4
Varroa destructor	2 588	14,6
Un problème concernant les reines	1 997	11,3
Conditions météo hivernales défavorables	1 759	9,92
Je ne sais pas	1 710	9,64
Une insuffisance de réserves alimentaires et/ou un problème de nourrissage	1 511	8,52
Autre cause (colonies vandalisées...)	328	1,85
Exposition contaminants chimiques pendant hivernage	327	1,84
Autre danger sanitaire	158	0,891

Les différentes causes de pertes avancées par les apiculteurs au niveau de la région Normandie sont présentées dans le tableau suivant.

*Tableau 25: Au niveau régional, nombre de citations des différentes causes ayant provoqué des pertes hivernales selon les apiculteurs et pourcentage de chaque cause en fonction du nombre total des causes avancées.*

<b>Causes citées</b>	<b>Nombre de citations</b>	<b>% parmi les citations</b>
Frelon asiatique	251	26,1
Des colonies de production/essaims/nuclei faibles au moment de la mise en hivernage	187	19,5
Conditions météo hivernales défavorables	110	11,5
Varroa destructor	105	10,9
Un problème concernant les reines	102	10,6
Une insuffisance de réserves alimentaires et/ou un problème de nourrissage	85	8,85
Je ne sais pas	81	8,44
Exposition contaminants chimiques pendant hivernage	18	1,88
Autre cause (colonies vandalisées...)	13	1,35
Autre danger sanitaire	8	0,833





Figure 34: Nombre et pourcentage de citations des différentes causes de mortalité par les apiculteurs inclus au niveau national (en haut) et au niveau régional (en bas) ayant déclaré de la mortalité dans leur cheptel.



## E. Mesures mises en place vis à vis de *Varroa destructor*

### 1. Surveillance du niveau d'infestation de *Varroa*

#### a) Mise en place d'une surveillance depuis la fin de l'hivernage

Après la sortie de l'hivernage et hors période de traitement, au niveau national 23,3 % des apiculteurs inclus ont déclaré avoir effectué une surveillance vis à vis de *Varroa* sur toutes leurs ruches (3 320 apiculteurs), 8,39 % des apiculteurs inclus sur une partie des ruches (1 195 apiculteurs), 59,1 % des apiculteurs inclus ont déclaré ne pas avoir fait de surveillance et 9,19 % des apiculteurs inclus n'ont pas répondu à la question (1 309 apiculteurs).

Au niveau régional, 27,2 % des apiculteurs inclus ont déclaré avoir effectué une surveillance vis à vis de *Varroa* sur toutes leurs ruches (200 apiculteurs), 8,99 % des apiculteurs inclus sur une partie de leurs ruches (66 apiculteurs), 53,4 % des apiculteurs inclus ont déclaré ne pas avoir fait de surveillance vis à vis de *Varroa* et 10,4 % des apiculteurs inclus n'ont pas répondu à la question (76 apiculteurs).

#### b) Méthodes de surveillance mises en oeuvre

Parmi les apiculteurs inclus au niveau national, 4 515 apiculteurs ont déclaré réaliser une ou plusieurs surveillances du taux d'infestation de *Varroa* en précisant la ou les méthodes utilisées, soit 31,7 % des apiculteurs inclus.

Parmi les apiculteurs inclus au niveau régional, 266 apiculteurs ont déclaré réaliser une ou plusieurs surveillance du taux d'infestation de *Varroa* en précisant la ou les méthodes utilisées, soit 36,2 % des apiculteurs inclus.

Les figures suivantes représentent les nombres des différentes méthodes de surveillance citées par les apiculteurs (plusieurs méthodes pouvaient être citées pour chaque apiculteur).




Figure 35: Méthodes de surveillance de l'infestation de Varroa que les apiculteurs ont déclaré avoir utilisées au niveau national (en haut) et régional (en bas).

Nombre de méthodes différentes de surveillance utilisées par les apiculteurs:




Figure 36: Nombre de méthodes de surveillance de l'infestation de Varroa que les apiculteurs ont déclaré avoir utilisées au niveau national (en haut) et régional (en bas).

*c) Nombre de mois où au moins une surveillance a été effectuée*

Nous nous intéressons maintenant au nombre de mois où il y a eu au moins une surveillance de l'infestation de *Varroa* déclarée réalisée par l'apiculteur.




Figure 37: Pourcentage d'apiculteurs inclus en fonction du nombre de mois où les apiculteurs ont déclaré avoir réalisé une surveillance de l'infestation de Varroa entre janvier 2023 et mars 2024 au niveau national (en haut) et régional (en bas).

La médiane et la moyenne du nombre de mois où les apiculteurs ont déclaré au moins une surveillance de l'infestation de *Varroa* sont respectivement de 2 et de 2,81 au niveau national. La médiane et la moyenne du nombre de mois où les apiculteurs ont déclaré avoir réalisé au moins une surveillance de l'infestation de *Varroa* sont respectivement de 2 et de 2,81 au niveau régional.

#### d) Périodes de surveillance

Les périodes de réalisation de la surveillance de *Varroa* telles que déclarées par les apiculteurs sont présentées dans la figure suivante.




Figure 38: Périodes de réalisation de la surveillance de l'infestation de varroa par les apiculteurs au niveau national (en haut) et régional (en bas).

## 2. Moyens de lutte mis en place

Au niveau national, sur les 15 derniers mois précédant la sortie d'hivernage 11 599 apiculteurs ont déclaré avoir mis en oeuvre un moyen de lutte contre *Varroa* sur l'ensemble de leurs CEN, soit ( 81,4% des apiculteurs inclus), 271 apiculteurs ont déclaré avoir mis en oeuvre un moyen de lutte contre *Varroa* sur une partie de leurs CEN, soit ( 1,9% des apiculteurs inclus), 1 044 apiculteurs ont déclaré n'avoir pas mis en oeuvre un moyen de lutte contre *Varroa* sur leurs CEN, soit ( 7,33% des

apiculteurs inclus) et 1 330 apiculteurs n'ont pas répondu à cette question, soit ( 9,34% des apiculteurs inclus).

Au niveau de la région Normandie, sur les 15 derniers mois précédant la sortie d'hivernage 596 apiculteurs ont déclaré avoir mis en oeuvre un moyen de lutte contre *Varroa* sur l'ensemble de leurs CEN, soit ( 81,2% des apiculteurs inclus), 14 apiculteurs ont déclaré avoir mis en oeuvre un moyen de lutte contre *Varroa* sur une partie de leurs CEN, soit ( 1,91% des apiculteurs inclus),47 apiculteurs ont déclaré n'avoir pas mis en oeuvre un moyen de lutte contre *Varroa* sur leurs CEN, soit ( 6,4% des apiculteurs inclus) et 77 apiculteurs n'ont pas répondu à cette question, soit ( 10,5% des apiculteurs inclus).

Concernant les moyens de lutte mis en œuvre, 64,79 % des apiculteurs inclus ont répondu avoir mis en place uniquement un/des traitement(s) médicamenteux (9 228 apiculteurs), 2,41 % des apiculteurs inclus ont répondu avoir mis en place uniquement une/des méthodes(s) biotechnique(s) (343 apiculteurs) et 16,22 % des apiculteurs inclus ont répondu avoir mis en place à la fois uniquement une/des méthodes(s) biotechnique(s) et uniquement un/des traitement(s) médicamenteux (2 311 apiculteurs).

Concernant les moyens de lutte mis en œuvre dans la région Normandie, 66,49 % des apiculteurs inclus ont répondu avoir mis en place uniquement un/des traitement(s) médicamenteux (488 apiculteurs), 2,45 % des apiculteurs inclus ont répondu avoir mis en place uniquement une/des méthodes(s) biotechnique(s) (18 apiculteurs) et 14,31 % des apiculteurs inclus ont répondu avoir mis en place à la fois uniquement une/des méthodes(s) biotechnique(s) et uniquement un/des traitement(s) médicamenteux (105 apiculteurs).




Figure 39: Type de moyen de lutte utilisé par les apiculteurs contre varroa en fonction de la taille de cheptel hiverné au niveau national (en haut) et au niveau régional (en bas). Les pourcentages par taille de cheptel hiverné sont précisés.

a) Lutte médicamenteuse

(1) Noms des traitements et associations utilisés

A la question “quels traitements médicamenteux avez-vous appliqués dans vos colonies de production/essaim/nucléi?”, 11 529 apiculteurs ont au moins coché une des propositions listées

au niveau national soit 80,9% des apiculteurs inclus. En région Normandie, le nombre d'apiculteurs ayant coché au moins une des propositions listées est de 594 apiculteurs soit 80,9 % des apiculteurs inclus au niveau régional.




Figure 40: Nombre d'apiculteurs inclus en fonction du nombre de traitements médicamenteux différents utilisés contre varroa au niveau national(en haut) et au niveau régional (en bas).Les pourcentages par rapport au total des apiculteurs inclus sont également précisés. Les traitements médicamenteux peuvent être divisés en deux catégories: traitement "flash" ou traitement "longue action". Les traitements Apibioxal, Oxybee, varroxal et Varromed sont



considérés comme des traitements “flash” et les autres traitements comme étant des traitements “longue action” (Bietrix, 2022). Les deux figures ci-dessous permettent de voir quelles sont les différentes combinaisons entre nombre de traitements “flash” et nombre de traitements “longue action” observées ainsi que les nombres et pourcentages d’apiculteurs inclus en fonction des différentes combinaisons réalisées.




Figure 41: Pourcentages et nombre d’apiculteurs inclus en fonction du nombre de traitements ‘longue action’ et ‘flash’ utilisés contre Varroa au niveau national. Par exemple, 16,7 % des apiculteurs inclus au niveau national ont déclaré avoir utilisé un traitement “longue action” et un traitement “flash”.




Figure 42: Pourcentages et nombre d'apiculteurs inclus en fonction du nombre de traitements 'longue action' et 'flash' utilisés contre Varroa au niveau régional.

La figure suivante permet de voir quels sont les traitements médicamenteux cités par les 7 134 apiculteurs inclus au niveau national et par les 372 apiculteurs au niveau régional qui n'ont cité qu'un seul traitement.




Figure 43: Pourcentage des traitements médicamenteux réalisées par les apiculteurs n'ayant cité qu'un seul traitement médicamenteux au niveau national (en haut) et régional (en bas).

La figure suivante permet de voir quelles sont les associations de deux traitements médicamenteux cités par les 3 907 apiculteurs inclus au niveau national et par les 195 apiculteurs au niveau régional qui ont cité deux traitements.




Figure 44: Pourcentage des différentes associations de deux traitements médicamenteux réalisées au niveau national (en haut) et régional (en bas) ayant été déclarées par les apiculteurs ayant cité deux traitements médicamenteux.

Si on regroupe les différents traitements médicamenteux par matière active alors on obtient les figures suivantes:




Figure 45: Nombre de citations réalisées par les apiculteurs au niveau national (en haut) et régional (en bas) par molécules actives.

A noter que les traitements basés sur les matières actives suivantes sont autorisés en apiculture biologique: thymol, acide oxalique et acide formique

## (2) Nombre d'applications

Concernant les applications de traitements médicamenteux, 13 205 apiculteurs ont rapporté au moins une application de traitement médicamenteux soit 92,7 % des apiculteurs inclus.

La figure suivante présente les pourcentages des apiculteurs en fonction du nombre d'applications qu'ils ont déclaré avoir réalisées.




Figure 46: Pourcentage d'apiculteurs inclus en fonction du nombre d'applications de traitements médicamenteux réalisées au niveau national (en haut) et régional (en bas) ayant déclaré avoir utilisé au moins uniquement un/des traitement(s) médicamenteux.




Figure 47: Pourcentage du nombre d'applications réalisées par les apiculteurs inclus en fonction de la catégorie de taille de cheptel hiverné au niveau national (en haut) et régional (en bas).

### (3) Périodes de réalisation des traitements médicamenteux

Les figures suivantes permettent de visualiser les périodes des différentes applications des traitements “longue action” et “flash” au niveau national et régional.




Figure 48: Périodes des différentes applications des traitements 'longue action' (en haut) et des traitements 'flash' déclarées comme réalisées par les apiculteurs inclus au niveau national qui ont déclaré avoir utilisé uniquement un/des traitement(s) médicamenteux.






Figure 49: Périodes des différentes applications des traitements ‘longue action’ (en haut) et des traitements ‘flash’ déclarées comme réalisées par les apiculteurs inclus au niveau national qui ont déclaré avoir utilisé uniquement un/des traitement(s) médicamenteux.

Il est intéressant de regarder quand s’effectuent les surveillances par rapport au(x) traitement(s) médicamenteux pour les apiculteurs qui ont déclaré en faire. Dans les logigrammes ci-dessous sont représentés le nombre d’apiculteurs inclus qui ont déclaré utiliser uniquement un/des traitement(s) médicamenteux, le nombre d’apiculteurs qui ont également déclaré faire une surveillance de l’infestation de *V. varroa*, avec le nombre de traitements “flash” et “longue action” pour lesquels des

dates de première application ont été rapportées et enfin quand les apiculteurs ont rapporté à la fois une date d'application des traitements et le mois de surveillance (une approximation a été faite en prenant comme date le 1er du mois), les deux dates (première application et première surveillance) ont été comparées pour distinguer les traitements qui ont été réalisés avant la surveillance (chiffre à minima compte-tenu de l'approximation) et les traitements qui ont été faits pendant ou après la surveillance (estimation haute).




Figure 50: Logigramme permettant de visualiser le nombre d'apiculteurs inclus au niveau national qui ont déclaré utiliser uniquement un/des traitement(s) médicamenteux, parmi eux ceux qui font une surveillance de l'infestation de *Varroa*, et pour les deux types de traitements, quand les informations étaient disponibles, une comparaison a été faite pour distinguer les traitements qui ont été réalisés avant la surveillance (chiffre à minima compte-tenu de l'approximation de la date de surveillance) et les traitements qui ont été faits pendant ou après la surveillance (estimation haute).

Au niveau de la région Normandie:




Figure 51: Logigramme permettant de visualiser le nombre d'apiculteurs inclus au niveau régional qui ont déclaré utiliser uniquement un/des traitement(s) médicamenteux, parmi eux ceux qui font une surveillance de l'infestation de *Varroa*, et pour les deux types de traitements, quand les informations étaient disponibles, une comparaison a été faite pour distinguer les traitements qui ont été réalisés avant la surveillance (chiffre à minima compte-tenu de l'approximation) et les traitements qui ont été faits pendant ou après la surveillance (estimation haute).

#### b) Méthodes biotechniques

Parmi les apiculteurs inclus au niveau national, 2 586 apiculteurs ont déclaré utiliser une ou plusieurs méthodes biotechniques, soit 18,2 % des apiculteurs inclus. Parmi les apiculteurs inclus au niveau régional, 122 apiculteurs ont déclaré utiliser une ou plusieurs méthodes biotechniques, soit 16,6 % des apiculteurs inclus.

Les figures suivantes représentent le nombre de méthodes biotechniques citées par les apiculteurs.




Figure 52: Nombre de méthodes biotechniques citées par les apiculteurs inclus utilisant des méthodes biotechniques au niveau national (en haut) et régional (en bas).

### III. Bibliographie

Bietrix Jacques. Thérapeutique en apiculture : bien utiliser les médicaments contre *Varroa destructor*. Bulletin des G.T.V., 2022, 108, pp.41-46. anses-03965082.





**Auteur contact**

Forfait Carole

[carole.forfait@inrae.fr](mailto:carole.forfait@inrae.fr)

[www.plateforme-esa.fr](http://www.plateforme-esa.fr)